

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA : INFORMĀCIJA ZĀĻU LIETOTĀJAM

Cavinton Forte 10 mg tabletes *Vinpocetinum*

Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju.

- Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.
- Ja Jums rodas jebkādi jautājumi, vaicājiet ārstam vai farmaceitam.
- Šīs zāles ir parakstītas Jums. Nedodiet tās citiem. Tās var nodarīt ļaunumu pat tad, ja šiem cilvēkiem ir līdzīgi simptomi.
- Ja Jūs novērojat jebkādas blakusparādības, kas šajā instrukcijā nav minētas vai kāda no minētajām blakusparādībām Jums izpaužas smagi, lūdzu izstāstiet to savam ārstam vai farmaceitam.

Šajā instrukcijā varat uzzināt:

1. Kas ir Cavinton Forte un kādam nolūkam to lieto
2. Pirms Cavinton Forte lietošanas
3. Kā lietot Cavinton Forte
4. Iespējamās blakusparādības
5. Kā uzglabāt Cavinton Forte
6. Sīkāka informācija

1. KAS IR CAVINTON FORTE UN KĀDAM NOLŪKAM TO LIETO

Cavinton Forte ir zāles noteiktu slimību, kas saistītas ar asinsrites traucējumiem smadzenēs, ārstēšanai. Cavinton Forte lieto arī psihisku vai neiroloģisku simptomu mazināšanai smadzeņu asinsrites traucējumu gadījumā un noteiktu acu un ausu slimību, kuru pamatā ir asinsvadu bojājumi, ārstēšanai vai simptomu mazināšanai.

2. PIRMS CAVINTON FORTE LIETOŠANAS

Nelietojiet Cavinton Forte šādos gadījumos:

- ja Jums ir paaugstināta jutība (alerģija) pret vinpocetīnu vai kādu citu preparāta sastāvdaļu;
- laktozes nepanesamības gadījumā (jāņem vērā laktozes saturs zālēs, jo katra 10 mg tablete satur 83 mg laktozes, t.i., pacienti ar retu iedzimtu galaktozes nepanesamību, Lapp laktāzes trūkumu vai glikozes – galaktozes malabsorbciju nedrīkst lietot šīs zāles);
- grūtniecības un zīdīšanas perioda laikā;
- bērniem;
- akūta hemorāģiska insulta, smagas koronārās sirds slimības un smagu aritmiju gadījumā.

Cavinton Forte jālieto pēc individuāla medicīniska novērtējuma:

- pie noteiktām sirds slimībām;
- ja Jums ir pazemināts asinsspiediens, atcerieties, ka ilgstoša Cavinton lietošana var izraisīt nelielu sistoliskā un diastoliskā asinsspiediena samazināšanos.
- pie paaugstināta intrakraniālā spiediena.
- ja lietojat zāles sirds ritma regulēšanai.

Grūtniecība un zīdīšanas periods:

Šīs zāles ir kontrindicētas grūtniecības vai zīdīšanas perioda laikā.

Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana:

Nav pieejami dati par to, ka vinpocetīns jebkādā veidā ietekmētu spēju vadīt transportlīdzekļus vai apkalpot mehānismus.

Svarīga informācija par kādu no preparāta sastāvdaļām:

Laktozes (piena cukura) nepanesības gadījumā jāņem vērā, ka katra Cavinton Forte 10 mg tablete satur 83 mg laktozes. Ja ārsts ir teicis, ka Jums ir kāda cukura nepanesamība, pirms lietojat šīs zāles, konsultējaties ar ārstu.

Citu zāļu lietošana:

Pastāstiet ārstam vai farmaceitam par visām zālēm, kuras lietojat vai pēdējā laikā esat lietojis, ieskaitot zāles, ko var iegādāties bez receptes.

Jums jāpastāsta savam ārstam, ja lietojat zāles, kas satur alfa metildopu, antikoagulantus (zāles, kas novērš asins sarecēšanu) vai antiaritmiskus līdzekļus (zāles, kas novērš sirds ritma traucējumus), arī zāles, kuras ietekmē centrālo nervu sistēmu.

3. KĀ LIETOT CAVINTON FORTE

Vienmēr lietojiet Cavinton Forte tieši tā, kā ārsts Jums stāstījis. Neskaidrību gadījumā vaicājiert ārstam vai farmaceitam. Ja ārsts nav noteicis citādi, parasti lieto pa pus tabletei (5 mg) vai pa tabletei 10 mg Cavinton Forte 3 reizes dienā.

Pacientiem ar nieru vai aknu slimībām deva nav jāpiemēro.

Tabletes jālieto pēc ēšanas.

Ja Jums radies iespaids, ka zāļu iedarbība ir pārāk stipra vai vāja, konsultējieties ar savu ārstu vai farmaceitu.

Ja esat lietojis Cavinton Forte vairāk nekā noteikts

Sazinieties ar savu ārstu vai dodieties uz tuvākās slimnīcas uzņemšanas nodaļu.

Ja esat aizmirsis lietot Cavinton Forte

Nelietojiet dubultu devu, jo Jūs nevarat aizvietot aizmirsto devu, bet riskējat pārdozēt zāles. Ieņemiet nākamo devu parastajā laikā.

4. IESPĒJAMĀS BLAKUSPARĀDĪBAS

Tāpat kā citas zāles, Cavinton Forte var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas.

Asins un limfatiskās sistēmas traucējumi

Reti: leukopēnija, trombocitopēnija;

• *oti reti:* anēmija, sarkano asins šūnu aglutinācija.

Imūnās sistēmas traucējumi

• *oti reti:* paaugstināta jutība.

Metabolisma un barošanās traucējumi

Ret•k: hiperholesterinēmija;

Reti: samazināta ēstgriba, anoreksija, cukura diabēts.

Psihiskie traucējumi

Reti: bezmiegs, miega traucējumi, uzbudinājums, nemiers;

• *oti reti:* eiforisks garastāvoklis, depresija.

Nervu sistēmas traucējumi

Ret•k: galvassāpes;

Reti: reibonis, garšas sajūtas traucējumi, stupors, hemiparēze, miegainība, amnēzija;

- *oti reti*: trīce, krampji.

Acu slimības

Reti: papillas tūska;

- *oti reti*: konjunktīvas hiperēmija.

Ausu un labirinta bojājumi

Reti• *k*: vertigo;

Reti: pastiprināta dzirde, pavājināta dzirde, trokšņi ausīs.

Sirds funkcijas traucējumi

reti: miokarda išēmija/infarkts, stenokardija, bradikardija, tahikardija, ekstrasistolē, sirdsklauves;

- *oti reti*: aritmija, priekškambaru mirdzēšana.

Asinsvadu sistēmas traucējumi

Reti• *k*: hipotensija;

Reti: hipertensija, pietvīkums, tromboflebīts;

- *oti reti*: asinsspiediena svārstības.

Kuņģa-zarnu trakta traucējumi

Reti• *k*: diskomforta sajūta vēderā, sausa mute, slikta dūša;

Reti: sāpes vēderā, aizcietējums, caureja, dispepsija, vemšana;

- *oti reti*: rīšanas traucējumi, stomatīts.

Ādas un zemādas audu bojājumi

Reti: eritēma, hiperhidroze, nieze, nātrene, izsitumi;

- *oti reti*: dermatīts.

Vispārēji traucējumi un reakcijas ievadišanas vietā

Reti: astēnija, nogurums, karstuma sajūta;

- *oti reti*: diskomforta sajūta krūškurvī, hipotermija.

Izmeklējumi:

Reti: pazemināts asinsspiediens, paaugstināts asinsspiediens, palielināts triglicerīdu

līmenis asinīs, ST segmenta depresija elektrokardiogrammā, samazināts/palielināts eozinofīlu skaits, aknu enzīmu pārmaiņas;

- *oti reti*: samazināts/palielināts balto asins šūnu skaits, samazināts sarkano asins šūnu skaits, saīsināts trombīna laiks, palielināta ķermeņa masa.

Ja novērojat jebkādas blakusparādības, kas šajā instrukcijā nav minētas vai kāda no minētajām blakusparādībām Jums izpaužas smagi, lūdzam par tām izstāstīt ārstam vai farmaceitam.

5. KĀ UZGLABĀT CAVINTON

Uzglabāt bērniem nepieejamā un neredzamā vietā.

Uzglabāt ārējā iepakojumā, lai pasargātu no gaismas.

Nelietot preparātu pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz iepakojuma.

6. SĪKĀKA INFORMĀCIJA

Ko Cavinton Forte satur

Aktīvā viela ir 10 mg vinpocetīna katrā tabletē.

Citas sastāvdaļas ir bezūdens koloidāls silīcija dioksīds, magnija stearāts, talks, kukurūzas ciete,

laktozes monohidrāts.

Cavinton Forte ārējais izskats un iepakojums

Izskats:

Baltas vai gandrīz baltas, diskveida formā, plakanas, noapaļotas tabletes ar atzīmi „10 mg” vienā pusē un dalījuma līniju otrā pusē.

Iepakojums:

90 tabletes.

Tabletes ir iepakotas PVH//alumīnija blisteros un salocītā kartona kārbā.

Primārā iepakojuma tulkojums:

CAVINTON FORTE 10 mg

tabletes

vinpocetīns

Gedeon Richter Plc.

Reģistrācijas apliecības īpašnieks un ražotājs:

Gedeon Richter Plc., 1103 Budapest, Gyömrői út 19-21, Ungārija

Teksta pārskatīšanas datums: 2011. gada decembris.

Reģistrācijas Nr. I000162

Paralēli importēto zāļu atļaujas turētājs, pārmarķētājs un pārpackotājs: SIA "Jelgavfarm", Zemgales prospekts 3, Jelgava, LV-3001; tālr.63022249