

ИНСТРУКЦІЯ  
по медицинскому применению препарата  
(информация для пациентов)

от 24.09.10 № 111

6029-29-08-09-12

Хартил® Амло капсулы 2,5 мг/2,5 мг  
Хартил® Амло капсулы 5 мг/5 мг  
Хартил® Амло капсулы 5 мг/10 мг  
Хартил® Амло капсулы 10 мг/5 мг  
Хартил® Амло капсулы 10 мг/10 мг  
(рамиприл/амлодипин)

Внимательно прочтайте всю эту инструкцию перед началом приема препарата.

- Сохраните этот листок-вкладыш. Возможно, вам потребуется прочитать его еще раз.
- Если у вас возникнут дополнительные вопросы, обратитесь к вашему врачу или фармацевту.
- Это лекарственное средство назначено вам. Не передавайте его другим людям. Оно может нанести им вред, даже если у них имеются те же симптомы заболевания.
- Если какой-либо побочный эффект будет вас серьезно беспокоить, или вы заметите побочные эффекты, не указанные в этой инструкции, следует сообщить об этом своему врачу или фармацевту.

Данный листок-вкладыш содержит следующую информацию:

- Что такое Хартил® Амло для чего его применяют
- До применения препарата Хартил® Амло
- Как следует применять Хартил® Амло
- Возможные побочные эффекты
- Как следует хранить Хартил® Амло
- Срок годности
- Условия отпуска из аптек
- Дополнительная информация

## 1. ЧТО ТАКОЕ ХАРТИЛ® АМЛО И ДЛЯ ЧЕГО ЕГО ПРИМЕНЯЮТ

Хартил® Амло состоит из двух препаратов, которые называются рамиприл и амлодипин. Рамиприл относится к группе лекарственных средств, называемых ингибиторами АПФ (ингибиторы ангиотензин-превращающего фермента), а амлодипин относится к группе лекарственных средств, называемых блокаторами кальциевых каналов.

Действие рамиприла:

- Снижает в Вашем организме выработку веществ, которые могут вызывать повышение кровяного давления.
- Расслабляет и расширяет Ваши кровеносные сосуды.
- Облегчает Вашему сердцу работу по перекачиванию крови во всём организме.

Действие амлодипина:

- Расслабляет и расширяет Ваши кровеносные сосуды.

Хартил® Амло может применяться для лечения пациентов с высоким кровяным давлением (гипертензией), на которых оба препарата по отдельности, принимаемые одновременно в тех же дозах, что и в комбинации, оказывают адекватное действие.

## 2. ДО ПРИМЕНЕНИЯ ПРЕПАРАТА ХАРТИЛ® АМЛО

Не следует принимать Хартил® Амло

- если у вас аллергия (повышенная чувствительность) к рамиприлу, амлодипину (активные вещества), любому другому дигидропиридиновому блокатору кальциевых каналов или препаратам – ингибиторам АПФ, а также к любым другим ингредиентам препарата Хартил® Амло, перечисленным в разделе 6.

Признаками аллергической реакции могут являться сыпь, затруднения при глотании или нарушения дыхания, отёки губ, лица, горла и языка;

- если Вы страдаете серьёзным сужением сосудов, препятствующим оттоку крови из левого желудочка (например, аортальным стенозом тяжёлой степени);
- если у Вас когда-либо возникала тяжёлая аллергическая реакция, называемая ангионевротическим отёком (отёком Квинке), признаками которого являются зуд, аллергическая сыпь (крапивница), красные следы на руках, ногах и шее, отёк горла и языка, отёки вокруг глаз и губ, затруднённое дыхание и глотание;
- если Вам назначен диализ или любой другой вид фильтрации крови. В этом случае приём препарата Хартил® Амло, в зависимости от используемой аппаратуры или разновидности мембран, может оказаться для Вас неэффективным или небезопасным;
- если Вы страдаете заболеваниями почек, при которых уменьшен приток крови к Вашей почке (стеноз почечной артерии);
- если у Вас аномально низкое или нестабильное кровяное давление. В этом случае Ваш лечащий врач должен дать своё заключение.

Не принимайте Хартил® Амло, если хотя бы одно из описанных выше состояний относится к Вам. Если Вы не уверены в этом, то, прежде чем принимать Хартил® Амло, проконсультируйтесь с врачом.

#### **С особой осторожностью следует принимать Хартил® Амло**

Проконсультируйтесь с врачом или фармацевтом, можно ли Вам принимать препарат в следующих случаях:

- если Вы пожилой человек;
- если Вы страдаете функциональными расстройствами сердца, печени или почек;
- если нарушен водно-солевой баланс Вашего организма [обезвоживание вследствие рвоты, поноса, повышенной потливости или приёма диуретиков (мочегонных препаратов) в течение длительного времени, либо недостаток соли вследствие нахождения на низко-солевой диете или проведения диализа];
- если Вы собираетесь пройти курс лечения для уменьшения аллергической реакции на укусы пчёл или ос (десенсибилизация);
- если Вам назначили обезболивающие препараты. Это может произойти при планировании хирургической или стоматологической операции. Возможно, тогда Вам придётся заблаговременно, за день до назначенной процедуры, прекратить приём препарата Хартил® Амло и обратиться к врачу за советом;
- если у Вас обнаружен повышенный уровень калия в крови (в результате проведения биохимического анализа крови);
- если Вы страдаете коллагенозом сосудов, например, склеродермии или системной красной волчанкой;


Если хотя бы один из перечисленных выше пунктов касается Вас (либо Вы в этом не уверены), то, прежде чем принимать Хартил® Амло, проконсультируйтесь с врачом.

#### **Взаимодействие с другими лекарственными средствами**

Сообщите врачу или фармацевту, если Вы принимаете или недавно принимали любые другие лекарственные средства, включая лекарственные средства, отпускаемые без рецепта (в том числе, лекарственные средства растительного происхождения). В этих случаях Хартил® Амло может повлиять на действие других лекарственных средств. Кроме того, некоторые лекарственные средства могут повлиять на действие Хартил® Амло.

Сообщите врачу, если Вы принимаете любое из следующих лекарственных средств. Они могут повлиять на действие препарата Хартил® Амло и снизить его эффективность:

- лекарственные средства, применяемые для облегчения симптомов боли и воспаления [например, нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП), такие, как ибuproфен или индометацин, а также аспирин];
- лекарственные средства, применяемые для лечения пациентов с пониженным кровяным давлением, а также при шоке, сердечной недостаточности, астме или аллергии, такие, как эфедрин, норадреналин и адреналин. Врач должен проверить Ваше артериальное давление;
- рифампицин (антибиотик, используемый для лечения пациентов с туберкулёзом);



- зверобой (лечение травами при депрессии);

Сообщите врачу, если Вы принимаете любое из следующих лекарственных средств. При одновременном приёме с препаратом Хартил® Амло они могут повысить риск возникновения побочных эффектов:

- лекарственные средства, применяемые для облегчения симптомов боли и воспаления [например, нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП), такие, как ибупрофен или индометацин, а также аспирин];
- лекарственные средства, назначаемые при онкологических заболеваниях (при прохождении курса химиотерапии);
- лекарственные средства, препятствующие отторжению органов после трансплантации, такие, как циклоспорин;
- диуретики (мочегонные средства), такие, как фуросемид;
- лекарственные средства, которые могут повысить концентрацию калия в крови, такие, как спиронолактон, триамтерен, амилорид, препараты калия и калийсодержащие заменители пищевой соли, а также гепарин (препарат, препятствующий свёртыванию крови);
- стероидные противовоспалительные лекарственные средства, такие, как преднизолон;
- аллопуринол (используется для понижения содержания мочевой кислоты в крови);
- прокаинамид (препарат для поддержания нормального сердечного ритма);
- кетоконазол, итраконазол (используются для лечения пациентов с грибковыми заболеваниями);
- эритромицин (антибиотик, используемый при некоторых бактериальных инфекциях);
- ритонавир (используется для лечения ВИЧ-инфицированных пациентов);
- дилтиазем (для лечения при ряде болезней сердца и высоком кровяном давлении).

Сообщите врачу, если Вы принимаете любое из следующих лекарственных средств. Хартил® Амло может влиять на них, изменяя их действие:

- лекарственные средства для лечения при диабете, такие, как инсулин и препараты для перорального применения, понижающие уровень глюкозы. Хартил® Амло может уменьшать уровень сахара в крови. При приёме препарата Хартил® Амло Вам следует постоянно контролировать содержание сахара в крови.
- литий (препарат для лечения при психических расстройствах). Хартил® Амло может повышать уровень лития в крови.

Содержание лития в Вашей крови должно постоянного контролироваться врачом.

Если хотя бы один из перечисленных выше пунктов касается Вас (либо Вы в этом не уверены), то, прежде чем принимать Хартил® Амло, проконсультируйтесь с врачом.

#### **Приём препарата Хартил® Амло одновременно с пищей и напитками**

- Употребление спиртных напитков во время приёма Хартил® Амло может вызвать у Вас чувство неопределенности, головокружения. Если у вас возникнет вопрос, сколько спиртного можно потреблять во время приёма препарата Хартил® Амло, то обсудите этот вопрос с врачом. Алкоголь и лекарственные средства, используемые для снижения кровяного давления, могут усиливать седативный эффект друг друга.
- Принимать Хартил® Амло можно до и после еды.

#### **Беременность и кормление грудью**

Если вы забеременели (или планируете беременность), то Вам следует сообщить об этом врачу.


Приём препарата Хартил® Амло во время беременности противопоказан.

Если Вы забеременели во время курса лечения Хартил® Амло, то Вам следует сообщить об этом врачу.

Переход на соответствующее альтернативное лечение должен быть выполнен до начала планируемой беременности.

Приём Хартил® Амло в период грудного вскармливания противопоказан.

Прежде, чем принимать какое-либо лекарственное средство, проконсультируйтесь с врачом или фармацевтом.



**Управление транспортными средствами и механизмами**

Во время приёма препарата Хартил® Амло Вы можете испытывать головокружение. Это происходит, чаще всего, в начале курса терапии препаратом Хартил® Амло или при переходе на более высокие дозы препарата. Если это происходит, то Вам следует отказаться от вождения транспортных средств и обслуживания машин и механизмов.

**Важная информация о некоторых компонентах препарата Хартил® Амло**

В состав оболочки капсул 5мг/5мг и 10мг/5мг входит краситель красный очаровательный (*allura red AC-FD&C Red 40 E-129*), а капсул 5мг/10мг и 10мг/10мг - азорубин (кармуазин) (E-122). Эти красители могут вызвать аллергическую реакцию.

**3. КАК СЛЕДУЕТ ПРИМЕНЯТЬ ПРЕПАРАТ ХАРТИЛ® АМЛО**

Всегда принимайте Хартил® Амло точно так, как его Вам назначает врач. Если Вы в чём-то не уверены, то Вам следует проконсультироваться с врачом или фармацевтом.

**Принимая это лекарственное средство, помните о том, что:**

- это лекарственное средство принимается через рот, ежедневно, в одно и то же время суток, как до еды, так и после неё.
- твёрдые капсулы с препаратом следует проглатывать целиком, запивая их жидкостью.
- твердые капсулы не следует раздавливать или разжёвывать.

**Дозировка**

- Обычная доза составляет 1 капсулу с дозировкой препарата, назначенной врачом.
- В зависимости от терапевтического эффекта, врач может увеличивать или изменять дозу.
- Максимальная доза составляет 1 капсулу с дозировкой препарата 10/10 мг, один раз в день.

**Назначение препарата при заболеваниях печени и почек**

При заболеваниях печени и почек дозировка препарата может быть изменена.

**Назначение препарата пожилым людям**

Врач уменьшит начальную дозу препарата и назначит мягкий режим дозирования.

Не рекомендуется назначать Хартил® Амло очень старым и немощным пациентам.

**Назначение препарата детям и подросткам**

Не рекомендуется назначать Хартил® Амло детям и подросткам моложе 18 лет, поскольку безопасность и эффективность применения препарата в этой группе пациентов не определена. Если Вы считаете, что терапевтический эффект препарата является слишком сильным или слишком слабым, то Вам следует проконсультироваться с врачом.

**Если Вы приняли больше препарата Хартил® Амло, чем необходимо**

Сообщить об этом врачу или незамедлительно обратиться в отделение скорой помощи ближайшей больнице. Не садитесь сами за руль автомобиля, чтобы доехать до больницы, а лучше попросите кого-то другого доставить Вас туда, либо вызовите по телефону скорую помощь. Сохраните использованную упаковку, пусть она находится при Вас. Её осмотр поможет врачу точно определить, какую именно дозу препарата Вы приняли.

**Если Вы забыли принять Хартил® Амло**

В следующий раз примите обычную дозу препарата. Не нужно принимать двойную дозу препарата для компенсации пропущенной дозы.


**Если Вы прекратили принимать Хартил® Амло**

До консультации с врачом не следует резко прерывать приём или изменять принимаемую дозу препарата, поскольку это может спровоцировать переход болезни в нестабильное состояние.

Если у Вас возникают какие-либо дополнительные вопросы по применению этого препарата, то Вам следует обратиться к врачу или фармацевту.

**4. ВОЗМОЖНЫЕ ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ**

Хартил® Амло, как и все другие лекарственные средства, может вызывать побочные эффекты, хотя и не у всех пациентов.



**При возникновении любого из серьезных побочных эффектов, перечисленных ниже, Вам следует прекратить приём Хартил® Амло и немедленно обратиться к врачу – Вам может потребоваться срочная медицинская помощь:**

- отёк лица, губ или горла, сопровождаемый затруднениями при глотании или дыхании, а также зуд и сыпь. Это может быть признаком тяжелой аллергической реакции на приём Хартил® Амло;
- тяжёлые кожные реакции, включая сыпь, язвы в ротовой полости, обострение уже имеющихся кожных заболеваний, покраснение, образование волдырей или расслоение кожи (например, синдром Стивенса-Джонсона, токсический эпидермальный некролиз или мультиформная эритема).

**Немедленно обратитесь к врачу, если Вы испытываете:**

- учащение сердечного ритма, неровное или усиленное сердцебиение (ощущение сердцебиения), боли в груди, стеснение в груди или более серьезные нарушения, в том числе, инфаркт и инсульт;
- одышку или кашель. Это может быть признаком нарушения дыхательной функции;
- частое возникновение кровоподтёков на коже, возникновение кровотечений, более продолжительных, чем обычно, а также любых других признаков кровотечения (например, кровотечение из дёсен), образование фиолетовых пятен на коже, либо более частую, чем обычно, заболеваемость инфекционными болезнями, боль в горле и лихорадку, чувство усталости, обморок, головокружение или бледность кожных покровов. Это может быть признаком нарушений со стороны кровеносной системы или костного мозга;
- тяжёлые боли в животе, которые могут распространяться на область спины. Это может быть признаком панкреатита (воспаления поджелудочной железы);
- лихорадку, озноб, усталость, потерю аппетита, боли в животе, тошноту, пожелтение кожи или глаз (желтуха). Это может быть признаком заболеваний печени, таких, как гепатит (воспаление печени), или повреждения печёночной ткани.


**Другие побочные эффекты:** обратитесь к врачу, если любой из нижеперечисленных побочных эффектов станет усиливаться или продлится дольше нескольких дней

**Частые побочные эффекты (регистрируются у 1-10 пациентов из 100)**

- сонливость (особенно в начале курса лечения);
- усиленное сердцебиение (ощущение Вами биения Вашего сердца), покраснение лица;
- отёчность голеностопных суставов (отёки);
- головная боль или ощущение усталости;
- головокружение. Это происходит, чаще всего, в начале курса терапии Хартил® Амло или при переходе на более высокие дозы препарата;
- обмороки, гипотензия (аномально низкое кровяное давление), особенно когда Вы стоите или быстро садитесь;
- затруднённый сухой кашель, воспаление носовых пазух (синусит) или бронхит, одышку;
- боли в области желудка или кишечника, диарея, несварение желудка, рвота или позывы к ней;
- сыпь на коже, с образованием волдырей и без таковых;
- боли в груди;
- судороги или боли в мышцах;
- обмороки;
- повышенный уровень калия в крови (выявленный в результате проведения биохимического анализа крови).

**Нечастые побочные эффекты (регистрируются у 1-10 пациентов из 1000)**

- изменения настроения, бессонница;
- дрожь;
- нарушения зрения (в том числе, дипlopия), звон в ушах;
- чихание/насморк;
- нарушения моторики кишечника (в том числе, диарея и запоры);
- выпадение волос;




- экзантема;
- возросшая потребность к мочеиспусканию, особенно ночью, затруднения и невозможность наступления эрекции;
- плохое самочувствие;
- боль в спине;
- увеличение или уменьшение массы тела;
- рост груди у мужчин;
- нарушения равновесия (головокружение);
- зуд и необычные кожные ощущения, такие, как онемение, пощипывание, покалывание, жжение или ощущение ползания мурашек на коже (парестезия);
- потеря или изменение вкусовых ощущений;
- расстройства сна;
- депрессия, беспокойство, повышенная нервозность или возбуждение;
- заложенность носа, затруднение дыхания или обострение течения астмы;
- возникновение отёка кишечника (называемого ангионевротическим отёком кишечника), выраженного симптомами боли в животе, рвотой и поносом;
- изжога, запор или ощущение сухости во рту;
- повышенное потребление воды (увеличение объёма выделяемой мочи) в течение дня;
- повышенная потливость;
- снижение или потеря аппетита (анорексия);
- учащение сердцебиения или аритмия;
- отёчность рук и ног. Это может быть признаком того, что в Вашем организме удерживается излишнее количество жидкости;
- расплывчатость зрения;
- боли в суставах;
- лихорадочное состояние;
- сексуальное бессилие у мужчин, снижение сексуального желания у мужчин и женщин;
- повышение уровня некоторых белых кровяных клеток (эозинофилия), выявленное в результате проведения анализа крови;
- изменения функциональной способности печени, поджелудочной железы и почек, выявленные в результате проведения анализов крови и биохимических анализов;
- сердечный приступ.

**Редкие побочные эффекты (регистрируются у 1-10 пациентов из 10000)**

- плохое самочувствие или спутанность сознания;
- покраснение и опухание языка;
- выраженное расслоение или шелушение кожи, зуд, шероховатая кожная сыпь;
- болезни ногтей (например, ослабление или отделение ногтя от ногтевого ложа);
- сыпь на коже или кровоподтеки;
- пятна на коже и понижение температуры конечностей;
- покраснение глаз, проявление зуда, отёчности или слезотечения;
- расстройства слух;
- уменьшение количества эритроцитов, лейкоцитов и тромбоцитов, или снижение уровня гемоглобина, выявленное в результате проведения анализов крови.

**Очень редкие побочные эффекты (регистрируются менее, чем у 1 пациента из 10000)**

- повышенное содержание сахара в крови;
- крапивница;
- вздутие живота или гастрит;
- воспаление поджелудочной железы;
- воспаление печени, пожелтение кожи (желтуха);
- повышенная чувствительность к воздействию солнечных лучей;
- эксфолиативный дерматит;
- увеличение дёсен.



**Другие зарегистрированные побочные эффекты (частота возникновения неизвестна)**  
Обратитесь врачу, если любой из перечисленных ниже побочных эффектов станет усиливаться или продлится дольше нескольких дней:

- затруднения с концентрацией внимания;
- воспаление слизистой оболочки ротовой полости с образованием незначительных изъязвлений;
- уменьшение количества кровяных телец, выявленное в результате проведения анализов крови;
- снижение концентрации натрия в крови, выявленное в результате проведения биохимических анализов;
- изменение цвета пальцев кистей и стоп на холода или при волнении, а в конце приступа, при восстановлении кровотока - ощущение жара и болезненного покалывания (синдром Рейно);
- замедление или нарушение психомоторных реакций;
- нарушение осязания;
- псориаз.

Если любой из перечисленных выше побочных эффектов станет усиливаться или продлится дольше нескольких дней, то Вам необходимо обратиться к врачу или фармацевту.

## 5. КАК СЛЕДУЕТ ХРАНИТЬ ХАРТИЛ® АМЛО

Хранить при температуре не выше 30°C, в недоступном для детей месте.

Не следует использовать препарат после истечения срока годности, указанного на упаковке! Датой истечения срока годности считается последний день указанного месяца.

Не применяйте Хартил® Амло, если заметили явные признаки ухудшения качества (например, изменение цвета).

## 6. СРОК ГОДНОСТИ

Срок годности указан на упаковке.

Не используйте препарат после истечения срока годности, указанного на упаковке!

## 7. УСЛОВИЯ ОТПУСКА ИЗ АПТЕК

Отпускается по рецепту врача

## 8. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

### Что содержится в препарате Хартил® Амло

Действующее вещество: одна капсула 2,5 мг/2,5 мг содержит 2,5 мг рамиприла и 2,5 мг амлодипина (в форме 3,475 мг амлодипина бесилата), 5 мг/5 мг содержит 5 мг рамиприла и 5 мг амлодипина (в форме 6,95 мг амлодипина бесилата), 5 мг/10 мг содержит 5 мг рамиприла и 10 мг амлодипина (в форме 13,9 мг амлодипина бесилата), 10 мг/5 мг содержит 10 мг рамиприла и 5 мг амлодипина (в форме 6,95 мг амлодипина бесилата) и 10 мг/10 мг содержит 10 мг рамиприла и 10 мг амлодипина (в форме 13,9 мг амлодипина бесилата) соответственно.

Вспомогательные вещества: кросповидон (E-1202), гипромеллоза (E-464), целлюлоза микрокристаллическая (E-460), глицерола дигенат.

Состав капсулы CONI-SNAP-3 (2,5 мг/2,5 мг): железа оксид красный (E-172), титана диоксид (E-171), желатин.

Состав капсулы CONI-SNAP-3 (5 мг/5 мг): бриллиантовый голубой (E-133), красный очаровательный (E-129), титана диоксид (E-171), желатин.

Состав капсулы CONI-SNAP-0 (5 мг/10 мг): титана диоксид (E-171), железа оксид красный (E-172), кармуазин (E-122), индигокармин + FD и С синий 2 (E-132), желатин.

Состав капсулы CONI-SNAP-0 (10 мг/5 мг): титана диоксид (E-171), железа оксид красный (E-172), бриллиантовый голубой (E-133), красный очаровательный (E-129), желатин.

Состав капсулы CONI-SNAP-0 (10 мг/10 мг): кармуазин (Е-122), индигокармин + FD и С синий 2 (Е-132), титана диоксид (Е-171), желатин.

**Внешний вид капсул Хартил® Амло и содержимое упаковки**

**Внешний вид:**

Хартил® Амло капсулы 2,5 мг/2,5 мг: твердые желатиновые капсулы CONI-SNAP 3, без маркировки, самозакрывающиеся, с непрозрачным основанием светло-розового цвета и непрозрачной крышкой светло-розового цвета.

Хартил® Амло капсулы 5 мг/5 мг: твердые желатиновые капсулы CONI-SNAP 3, без маркировки, самозакрывающиеся, с непрозрачным основанием светло-бордового цвета и непрозрачной крышкой светло-бордового цвета.

Хартил® Амло капсулы 5 мг/10 мг: твердые желатиновые капсулы CONI-SNAP 0, без маркировки, самозакрывающиеся, с непрозрачным основанием светло-розового цвета и непрозрачной крышкой светло-бордового цвета.

Хартил® Амло капсулы 10 мг/5 мг: твердые желатиновые капсулы CONI-SNAP 0, без маркировки, самозакрывающиеся, с непрозрачным основанием светло-розового цвета и непрозрачной крышкой светло-бордового цвета.

Хартил® Амло капсулы 10 мг/10 мг: твердые желатиновые капсулы CONI-SNAP 0, без маркировки, самозакрывающиеся, с непрозрачным основанием темно-бордового цвета и непрозрачной крышкой темно-бордового цвета.

Смесь гранул и порошков белого или почти белого цвета, не содержащая механических примесей, без или почти без запаха.

**Упаковка:**

По 7 или 10 капсул в блистере из комбинированной пленки «cold»: (полиамид / алюминиевая фольга / ПВХ) // алюминиевая фольга. 4 или 8 блистеров (по 7 капсул) или 3 или 9 блистеров (по 10 капсул) помещены в картонную пачку вместе с инструкцией по медицинскому применению для пациентов.

**ВЛАДЕЛЕЦ ТОРГОВОЙ ЛИЦЕНЗИИ И ПРОИЗВОДИТЕЛЬ**

ОАО Фармацевтический Завод ЭГИС  
1106 Будапешт, ул. Керестури 30-38  
ВЕНГРИЯ

