

Lietošanas instrukcija: informācija zāļu lietotājam

Aurocard pilieni iekšķīgai lietošanai, šķīdums

Crataegus Ø, Aurum chloratum D4, Convallaria majalis D1, Strychnos ignatii D4, Arnica montana Ø

Pirms šo zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju.

Vienmēr lietojiet šīs zāles tieši tā, kā aprakstīts šajā instrukcijā vai arī tā, kā to noteicis ārsts vai farmaceits.

- Saglabājiēt šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.
- Ja Jums ir nepieciešama papildus informācija vai padoms, vaicājiēt farmaceitam.
- Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējiēt ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz iespējamām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Skatīt 4. punktu.
- Ja pēc 7 dienām nejiūtaties labāk vai jiūtaties sliktāk, Jums jākonsultējas ar ārstu.

Šajā instrukcijā varat uzzināt:

1. Kas ir Aurocard un kādam nolūkam to lieto
2. Kas Jums jāzina pirms Aurocard lietošanas
3. Kā lietot Aurocard
4. Iespējamās blakusparādības
5. Kā uzglabāt Aurocard
6. Iepakojuma saturs un cita informācija

1. Kas ir Aurocard un kādam nolūkam to lieto

Farmakoterapeitiskā grupa

Homeopātiskās zāles.

Terapeitiskās indikācijas

Viegla sirds mazspēja, īpaši vecāka gadagājuma pacientiem.

2. Kas Jums jāzina pirms Aurocard lietošanas

Nelietojiet Aurocard šādos gadījumos:

- ārstēšanas laikā ar *Digitalis* (uzpirkstītes) glikozīdiem
- kālija deficīta gadījumā
- ja Jums ir alerģija pret *Arnica* (arniku) vai citām aktīvajām vielām, vai kādu citu (6. punktā minēto) šo zāļu sastāvdaļu.

Brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Aurocard ieteicams lietot pēc ārsta konsultācijas. Preparāts neaizvieto citus medikamentus, kas nozīmēti minētās slimības ārstēšanai. Preparātu izmanto kompleksai terapijai kopā ar citām, ārsta nozīmētām zālēm. Ja simptomi neizzūd vai parādās jauni, īpaši, jebkura rakstura sāpes, nepieciešams konsultēties ar ārstu. Ja simptomi saglabājas ilgāk par 6 nedēļām, vai arī, ja novēro kāju tūsku, konsultējiēt ar ārstu. Nepieciešama medicīniska izmeklēšana gadījumos, ja sāpes jiutamās sirds rajonā vai izplatās uz rokām, vēdera augšējā daļā vai kaklā, kā arī aizdusas gadījumā.

Šīs zāles satur 48% etilspirta (alkohola).

Pastāv risks pacientu veselībai, kuri cieš no aknu slimībām vai alkoholisma. Citu zāļu iedarbība var tikt pakļauta negatīvai ietekmei, vai arī tikt pastiprināta.

Šī preparāta lietošana bērnu ārstēšanai nav pietiekami dokumentēta, tādēļ, kā arī alkohola satura dēļ, preparātu nedrīkst lietot bērniem līdz 12 gadu vecumam.

Citas zāles un Aurocard

Pastāstiet ārstam vai farmaceitam par visām zālēm, kuras lietojat pēdējā laikā, esat lietojis vai varētu lietot.

Iedarbība un blakusparādības var pastiprināties, vienlaicīgi lietojot hinidīnu, kalciju, diurētiskus līdzekļus vai caurejas līdzekļus un ilgstošā terapijā ar kortizonu saturošiem medikamentiem.

Aurocard kopā ar uzturu, dzērieniem un alkoholu

Homeopātisku medicīnas preparātu iedarbību var ietekmēt kaitīgie ieradumi vai stimulatoru lietošana, tādu kā alkohols un tabaka.

Grūtniecība un barošana ar krūti

Šobrīd nav pietiekami daudz pētījumu datu preparāta lietošanai grūtniecēm un barojošām mātēm, tādēļ, kā arī alkohola satura dēļ, Aurocard grūtniecības un laktācijas periodā drīkst lietot tikai pēc konsultācijas ar ārstu.

Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana

Aurocard neietekmē spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus.

Aurocard satur saharozi, etilspirtu (alkoholu)

Ja ārsts Jums ir teicis, ka Jums ir dažu cukuru nepanesamība, pirms šo zāļu lietošanas konsultējaties ar ārstu.

Šīs zāles satur nelielu etilspirta (alkohola) daudzumu, mazāk nekā 100 mg vienā devā.

Piezīme: Ilgstoši uzglabājot augu ekstraktu, šķīdumā var parādīties nogulsnes, kas nekādā gadījumā neietekmē preparāta efektivitāti. Tā kā Aurocard ir dabisks produkts, ir iespējamās nelielas krāsas un garšas izmaiņas.

3. Kā lietot Aurocard

Vienmēr lietojiet šīs zāles tieši tā, kā aprakstīts šajā instrukcijā vai kā ārsts vai farmaceits Jums teicis(-kusi). Neskaidrību gadījumā vaicāiet ārstam vai farmaceitam.

Lietot pa 20 pilieniem 3 reizes dienā.

Pilienus lieto pusstundu pirms vai pusstundu pēc ēšanas, pirms norīšanas zāles paturēt mutē.

Pat homeopātiskās zāles nav jālieto ilgstošu laiku bez medicīniskās novērošanas (skat. arī „*Brīdinājumi un piesardzība lietošanā*”).

Ja esat lietojis Aurocard vairāk nekā noteikts

Pārdozēšanas gadījumā var saindēties ar *Convallaria majalis* (maiļpuķīšu) glikozīdiem. *Convallaria majalis* (maiļpuķīšu) glikozīdu pārdozēšanas simptomi ir līdzīgi *digitalis* (uzpirkstītes) glikozīdu pārdozēšanas simptomiem. Galvenie simptomi: sirds ritma traucējumi, slikta dūša un vemšana, redzes traucējumi, reiboņi, apjukums, halucinācijas. Šādu sūdzību gadījumā nekavējoties jāgriežas pie ārsta.

Ja esat aizmirsis lietot Aurocard

Nelietojiet dubultu devu, lai aizvietotu aizmirsto devu.

Ja pārtraucat lietot Aurocard

Pārtraucot Aurocard lietošanu, kaitīga ietekme nav gaidāma.

Ja Jums ir kādi jautājumi par šo zāļu lietošanu, jautāiet ārstam vai farmaceitam.

4. Iespējamās blakusparādības

Tāpat kā visas zāles, šīs zāles var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas.

Lietojot Aurocard, var parādīties sirds ritma traucējumi, slikta dūša un vemšana. Šajā gadījumā jāpārtrauc lietošana un jāgriežas pie ārsta.

Piezīme: lietojot homeopātiskās zāles stāvoklis var īslaicīgi pasliktināties (sākotnējā homeopātiskā pasliktināšanās). Šādā gadījumā jāpārtrauc lietošana un jākonsultējas ar ārstu.

Ziņošana par blakusparādībām

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz iespējamajām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Jūs varat ziņot par blakusparādībām arī tieši Zāļu valsts aģentūrai, Jersikas ielā 15, Rīgā, LV 1003. Tālr.: +371 67078400; Fakss: +371 67078428. Tīmekļa vietne: www.zva.gov.lv.

Ziņojot par blakusparādībām, Jūs varat palīdzēt nodrošināt daudz plašāku informāciju par šo zāļu drošumu.

5. Kā uzglabāt Aurocard

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Nelietojiet šīs zāles pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz marķējuma un kastītes pēc „Der. līdz”. Derīguma termiņš attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu.

Uzglabāt temperatūrā līdz 25°C. Uzglabāt pudelīti cieši aizvērtu.

Neizmetiet zāles kanalizācijā vai sadzīves atkritumos. Vaicājiert farmaceutam, kā izmest zāles, kuras vairs nelietojat. Šie pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi.

6. Iepakojuma saturs un cita informācija

Ko Aurocard satur

- 1 g (1,04 ml) šķīduma satur šādas aktīvās vielas: Crataegus Ø 0,4 g, Aurum chloratum D4 0,1 g, Convallaria majalis D1 0,1 g, Strychnos ignatii D4 0,1 g, Arnica montana Ø 0,005 g.
- Citas sastāvdaļas: saharoze, etilspirts (96%), attīrīts ūdens.

1 ml šķīdumā ir 20 pilieni.

Satur 48 % (tilp./tilp.) etilspirta.

Aurocard ārējais izskats un iepakojuma saturs

Šķīdums ir tumši brūns.

Aurocard iepakots brūnā stikla pudelītē. Viena pudelīte satur 30 ml pilienu iekšķīgai lietošanai, šķīduma.

Reģistrācijas apliecības īpašnieks un ražotājs

Deutsche Homöopathie-Union
DHU-Arzneimittel GmbH & Co. KG
Ottenstr. 24, 76227 Karlsruhe, Vācija
tālr. +49721409301

fakss +497214093316
e-pasts: info@dhu.com

Lai saņemtu papildus informāciju par šīm zālēm, lūdzam sazināties ar reģistrācijas apliecības īpašnieka vietējo pārstāvniecību:

SIA „Mitela”
Brīvības ielā 183/1
Rīga LV-1012
Tel: 67360781

Šī lietošanas instrukcija pēdējo reizi pārskatīta 14.01.2014.