

## **Pakendi infoleht: teave kasutajale**

### **BENZOTAL, 200 mg/g salv** Bensüülbensoaat

#### **Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.**

Kasutage seda ravimit alati täpselt nii, nagu on kirjeldatud selles infolehes või nagu arst või apteeker on teile selgitanud.

- Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
- Lisateabe saamiseks pidage nõu oma apteekriga.
- Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.
- Kui pärast 14 päeva möödumist haigussümptomid ei leevendu või süvenevad, peate oma arstiga ühendust võtma.

#### **Infolehe sisukord**

1. Mis ravim on Benzotal ja milleks seda kasutatakse
2. Mida on vaja teada enne Benzotali kasutamist
3. Kuidas Benzotali kasutada
4. Võimalikud kõrvaltoimed
5. Kuidas Benzotali säilitada
6. Pakendi sisu ja muu teave

#### **1. Mis ravim on Benzotal ja milleks seda kasutatakse**

Benzotal salv on paiksest kasutatav nahaparasiitide vastane preparaat, mida kasutatakse sügeliste raviks.

#### **2. Mida on vaja teada enne Benzotali kasutamist**

##### **Ärge kasutage Benzotali:**

- kui olete bensüülbensoaadi või selle ravimi mis tahes koostisosa (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline.

##### **Hoiatused ja ettevaatusabinõud**

Ärrituse vältimiseks tuleb jälgida, et salvi ei satuks silma, limaskestadele või vigastatud nahale.

Ülitundlikkuse väljaselgitamiseks on soovitatav eelnevalt väikese koguse salviga määrata naha tundlikkus preparaadi suhtes.

##### **Muud ravimid ja Benzotal**

Koostoimeid teiste ravimitega ei ole täheldatud.

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud või kavatsete kasutada mis tahes muid ravimeid.

### **Rasedus ja imetamine**

Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arsti või apteekriga.

Raseduse ajal võib salvi kasutada. Ravi vajadusel imetamise perioodil tuleb rinnaga toitmine katkestada, pärast salvi mahapesemist võib rinnaga toitmist jätkata. Enne ravimi kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga.

### **Autojuhtimine ja masinatega töötamine**

Benzotal ei avalda toimet autojuhtimise ja liikuvate mehhanismide käsitlemise võimele.

### **Benzotal sisaldab bronopoli, metüülparahüdroksübensoaati (E 218) ja propüülparahüdroksübensoaati (E 216)**

Bronopol võib tekitada paikseid nahareaktsioone (nt kontaktdermatiiti).

Metüülparahüdroksübensoaat ja propüülparahüdroksübensoaat võivad tekitada allergilisi reaktsioone (ka hilistüüpi).

## **3. Kuidas Benzotali kasutada**

Kasutage seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst või apteeker on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Esmakordsel kasutamisel suruge tuubi avamiseks kork tagurpidi vastu tuubi otsas olevat fooliumkilet.

Korraga määratakse nahale 10...15 g salvi. Salv kantakse eelnevalt pestud nahale ning hõõrutakse naha sisse. Esmalt määratakse salvi käelabadele, käsivartele, seejärel teistele kehaosadele alanevas järjekorras. Kõige lõpuks määratakse salvi jalgadele, jalataldadele ning varbavahedesse. Lastel kaetakse salviga kogu nahapind, täiskasvanutel jäetakse katmata nägu ja peanahk. Õrna nahaga kohtades (kubemepiirkond, suguelundid, rinnanäärmed), samuti ekseemi (punetava ja sageli leemendava mitterakkava lööbe) ja nahapõletiku korral tuleb salvi määrada ettevaatlikult, jättes selle naha sisse hõõrumata.

Pärast salvi kasutamist ei tohi 3 tunni jooksul käsi pesta. Pärast igakordset kätepesu tuleb käsi uuesti salviga määrada. Kogu keha tohib pesta alles 3 päeva möödumisel. On oluline, et pärast salvi kasutamist kasutataks puhast ihu- ja voodipesu ning puhtaid rõivaid.

Salvi määratakse nahale 4 korda 2 nädala jooksul (3...4 päeva tagant). Ravikuuriks kulub keskmiselt 60...90 g salvi (2...3 tuubi).

Benzotal on ainult välispidiseks kasutamiseks! Mitte alla neelata!

### **Kui te kasutate Benzotali rohkem kui ette nähtud**

Väga suure koguse salvi pealemäärimise korral võib tekkida kesknärvisüsteemi erutus seisund (krambid) ja/või kusepeetus. Eelpoolnimetatud nähtude ilmnemisel tuleb salv nahalt maha pesta, vajadusel manustada krambivastast ravimit.

Üleannustamisnähtude ilmnemisel või üleannustamise kahtluse korral pöörduge kohe arsti poole. Võtke ravimi pakend arsti juurde kaasa.

### **Kui peaksite kogemata Benzotali alla neelama**

Salvi juhusliku allaneelamise korral võib tekkida kesknärvisüsteemi erutus seisund (krambid) ja/või kusepeetus. Eelpoolnimetatud nähtude ilmnemisel tuleb salv nahalt maha pesta,

vajadusel manustada krambivastast ravimit. Salvi juhusliku allaneelamise korral teha võimalusel korduvalt maoloputust ning takistada aktiivsõega salvi imendumist seedetraktist. Salvi juhusliku allaneelamise korral pöörduge kohe arsti poole. Võtke ravimi pakend arsti juurde kaasa.

#### **Kui te unustate Benzotali kasutada**

Kasutage seda niipea, kui võimalik ja seejärel jätkake nagu tavaliselt. Kui on juba käes järgmise kasutamise aeg, siis kasutage ettenähtud kogus ja seejärel jätkake nagu tavaliselt. Ärge kasutage kahekordset annust, kui annus jäi eelmisel korral kasutamata.

**Kui te lõpetate Benzotali kasutamise** enne ravikuuri lõppu, siis võib ravi osutuda ebaefektiivseks. Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

#### **4. Võimalikud kõrvaltoimed**

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

*Paiksed kõrvaltoimed.* Salvi hõõrumisel naha sisse võib tekkida kipitustunne, mis kaob mõne minuti möödumisel. Naha ülitundlikkuse korral võib Benzotali kasutamisel tekkida nahaärritus või põletustunne. Kõrvaltoimete püsimisel peab ravi katkestama ning salvi nahalt maha pesema.

#### **Kõrvaltoimetest teavitamine**

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud.

Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada [www.ravimiamet.ee](http://www.ravimiamet.ee) kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

#### **5. Kuidas Benzotali säilitada**

Hoida temperatuuril kuni 25 °C.

Mitte hoida külmkapis või lasta külmuda.

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud pakendile. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

#### **6. Pakendi sisu ja muu teave**

##### **Mida Benzotal sisaldab**

- Toimeaine on bensüülbensoaat (*Benzylis benzoas*).

- Teised koostisosad on polüsorbaat 80, karbomeer, naatriumhüdroksiid, metüülparahüdroksübensoaat (E 218), propüülparahüdroksübensoaat (E 216), bronopol ja puhastatud vesi.

#### **Kuidas Benzotal välja näeb ja pakendi sisu**

Valge või peaaegu valge värvusega spetsiifilise lõhnaga salv.  
30 g salvi alumiiniumtuubis, alumiiniumtuub kartongkarbis.

#### **Müügiloa hoidja**

AS GRINDEKS.

Krustpils iela 53, Rīga, LV-1057, Läti

Tel.: +371 67083205

Faks: +371 67083505

e-mail: [grindeks@grindeks.lv](mailto:grindeks@grindeks.lv)

#### **Tootjad**

Tallinna Farmaatsiatehase AS

Tondi 33, 11316 Tallinn, Eesti

AS GRINDEKS.

Krustpils iela 53, Rīga, LV-1057, Läti

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole:

AS Grindeks Eesti filiaal

Tondi 33, 11316 Tallinn

Tel.: +372 6120224,

Faks: +372 6120331

Infoleht on viimati kooskõlastatud augustis 2014