

Pakendi infoleht: teave kasutajale

STREPSILS MENTHOL & EUCALYPTUS, losengid (imemistabletid)

Amüülmetakresool, 2,4-diklorobensüülalkohol, levomentool

Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

Kasutage seda ravimit alati täpselt nii, nagu on kirjeldatud selles infolehes või nagu arst, apteeker või meditsiiniõde on teile selgitanud.

- Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
- Lisateabe saamiseks pidage nõu oma apteekriga.
- Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.
- Kui pärast 3 päeva möödumist te ei tunne end paremini või tunnete end halvemini, peate võtma ühendust arstiga.

Infolehe sisukord:

1. Mis ravim on Strepsils Menthol & Eucalyptus ja milleks seda kasutatakse
2. Mida on vaja teada enne Strepsils Menthol & Eucalyptus`e kasutamist
3. Kuidas Strepsils Menthol & Eucalyptus`t kasutada
4. Võimalikud kõrvaltoimed
5. Kuidas Strepsils Menthol & Eucalyptus`t säilitada
6. Pakendi sisu ja muu teave

1. Mis ravim on Strepsils Menthol & Eucalyptus ja milleks seda kasutatakse

Strepsils Menthol & Eucalyptus imemistabletid sisaldavad kahe antiseptilise toimeaine kombinatsiooni, mis toimib suu- ja neelupõletikke tekitavatele bakteritele. Mentool leevendab ninakinnisust. Strepsils Menthol & Eucalyptus imemistablette kasutatakse desinfitseeriva vahendina suu- ja neelupõletike korral.

2. Mida on vaja teada enne Strepsils Menthol & Eucalyptus`e kasutamist

Ärge kasutage Strepsils Menthol & Eucalyptus`t:

- kui olete toimeaine(te) või selle ravimi mis tahes koostisosa(de) (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline.

Lapsed: see ravim ei ole soovitatav väikestele lastele lämbumisohu tõttu.

Patsiendid, kellel on pärilik fruktoosi talumatus, glükoosi-galaktoosi malabsorptsioon või sukraas-isomaltasi puudulikkus, ei tohi seda ravimit kasutada

Rasedus, imetamine ja viljakus:

Rasedus

Amüülmetakresooli ja 2,4-diklorobensüülalkoholi kasutamise kohta andmed puuduvad või on piiratud.

Nagu kõigi ravimite puhul, tuleb ettevaatlik olla ka selle ravimi kasutamisel raseduse ajal ning vajadusel pidada nõu arstiga.

Imetamine

Ei ole teada kas 2,4-diklorobensüülalkohol ja amüülmetakresool või nende metaboliidid erituvad rinnapiima. Ohtu vastsündinule/imikule ei saa välistada.

Viljakus

Toime kohta viljakusele andmed puuduvad.

3. Kuidas Strepsils Menthol & Eucalyptus` t kasutada

Sümptomite leevendamiseks kasutada minimaalset efektiivset annust võimalikult lühikese aja jooksul.

Täiskasvanud: 1 imemistablett lasta suus aeglaselt sulada iga 2 kuni 3 tunni järel, kuid mitte üle 8 tableti ööpäevas.

Lapsed

Üle 6-aastased lapsed: nagu eelpool täiskasvanud.

Alla 6-aastased lapsed: ei sobi alla 6 aasta vanustele lastele.

Eakad: nagu eelpool täiskasvanud.

Ärge ületage lubatud annust.

Kui te võtate Strepsils Junior`i rohkem kui ette nähtud

Üleannustamisel võivad tekkida seedetrakti vaevused.

4. Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki. Kõrvaltoimete esinemissageduse hindamisel on kasutatud järgmisi kriteeriume:

Väga sage: tekib rohkem kui ühel kasutajal 10st

Sage: tekib 1...10 kasutajal 100st

Aeg-ajalt: tekib 1...10 kasutajal 1000st

Harv: tekib 1...10 kasutajal 10000st

Väga harv: tekib vähem kui ühel kasutajat 10000st

Teadmata: sagedust ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel

Immuunsüsteemi häired:

Teadmata: ülitundlikkusreaktsioonid

Seedetrakti häired:

Teadmata: kõhuvalu, iiveldus, ebamugavustunne suus

Naha ja nahaaluskoe kahjustused:

Teadmata: lööve

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

5. Kuidas Strepsils Menthol & Eucalyptus` t säilitada

Hoida temperatuuril kuni 25 °C. Hoida originaalpakendis, niiskuse eest kaitstult.

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

6. Pakendi sisu ja muu teave

Mida Strepsils Menthol & Eucalyptus sisaldab

Toimeained on amüülmetakresool ja 2,4-diklorobensüülalkohol. Üks imemistablett sisaldab 0,6 mg amüülmetakresooli, 1,2 mg 2,4-diklorobensüülalkoholi ja 8 mg levomentooli. Abiained on eukalüptiõli, viinhape, indigokarmiin (E132), veeldatud suhkur, veeldatud glükoos, vesi.

Kuidas Strepsils Menthol & Eucalyptus välja näeb ja pakendi sisu

Losengid on pakitud blisterpakendisse, mis on tehtud läbipaistvast 250 mikroni paksusest polüvinüülkloriidist (PVC), kaetud 40 gsm polüvinüülideenkloriidiga (PVDC); kuumtihendatud 20 mikroni paksuse alumiiniumkattega ning kaetud 7 gsm lakiga. Blisterpakendis on 12 tabletti. Kaks või kolm blisterit on pakitud pappkarpi. Loseng (imemistablett) on sinine ja ringikujuline (läbimõõt 1,8cm).

Müügiloa hoidja:

Reckitt Benckiser (Poland) S.A.
Ul.Okunin 1
05-100 Nowy Dwor Mazowiecki
Poola

Tootja:

Reckitt Benckiser Healthcare International Ltd
Nottingham site
Thane Road
Nottingham NG90 2DB
Ühendkuningriik

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.

Kärberi 34-30
Tallinn 13919
Tel: 5151555

Infoleht on viimati uuendatud mais 2017.