

PAKENDI INFOLEHT: INFORMATSIOON KASUTAJALE

Pharmatex 12mg/g, vaginaalkreem Bensalkooniumkloriid

Lugege infolehte hoolikalt, sest siin on teile vajalikku teavet.

Ehkki seda ravimit on võimalik osta ilma retseptita, peate parima ravitulemuse saamiseks kasutama Pharmatex täpselt juhiste järgi vastavalt.

- Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
- Lisainformatsiooni saamiseks pidage nõu oma apteekriga.
- Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks, või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet, mida selles infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile või apteekrile.

Infolehes antakse ülevaade:

1. Mis ravim on Pharmatex ja milleks seda kasutatakse
2. Mida on vaja teada enne Pharmatex'i kasutamist
3. Kuidas Pharmatex'i kasutada
4. Võimalikud kõrvaltoimed
5. Kuidas Pharmatex'i säilitada
6. Lisainfo

1. MIS RAVIM ON PHARMATEX JA MILLEKS SEDA KASUTATAKSE

Pharmatex'i kasutamine võimaldab hoiduda rasestumisest, kuid ei anna 100% kaitset. Ravimi kontratseptiivne efektiivsus sõltub eelkõige selle õigest kasutamisest.

Rasestumisvastane ravim, mis sobib eriti hästi järgmistel juhtudel: rasestumisvastaste tablettide või emakasisese vahendi kasutamine on vastunäidustatud; suguelu on ebaregulaarne; sünnitus- või abordijärgsel perioodil; rinnaga toitmise ajal; menopausieelsel perioodil; suukaudsete tablettide kasutamise puhul, kui tableti võtmine on hilineunud. Viimasel juhul tuleks kasutada Pharmatex'i koos suukaudsete tablettidega kuni menstruatsioonitsükli lõpuni. Võib kasutada ka täiendavalt koos emakasisese spiraaliga.

Näidustused. Raseduse vältimine.

2. MIDA ON VAJA TEADA ENNE PHARMATEX'I KASUTAMIST

Ärge kasutage Pharmatex'i

- kui te olete allergiline (ülitundlik) bensalkooniumkloriidi või Pharmatex'i mõne koostisosa suhtes.
- kui te kasutate samaaegselt teisi tupesiseselt manustatavaid ravimeid.
- vahetult enne ja pärast sugühet ei tohi pesta seebiga.

Eriline ettevaatus on vajalik ravimiga Pharmatex

Rasestumisvastane toime sõltub eelkõige õigest kasutamisest. Kasutatakse enne igat sugühet sõltumata menstruatsioonitsükli päevast. Korduva sugühte korral tuleb alati manustada uus annus. Pharmatex'i kasutades ei tohi enne ja pärast sugühet kasutada pesemiseks seepi, kuna viimane katkestab bensalkooniumkloriidi toime. **Väline tualett on lubatud ainult puhta veega või spetsiaalse seebialust mittesisaldava Pharmatex pesemisvahendiga.** Haavandite tekkimisel välissuguelunditele ravimi kasutamine lõpetada. **Tähelepanu! Ei kaitse suguhaigustesse nakatumise eest!**

Ainult tupesiseks manustamiseks.

Kasutamine koos teiste ravimitega

Palun informeerige oma arsti kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud mingeid muid ravimeid, kaasa arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid.

Pharmatex'iga üheaegselt ei tohi kasutada teisi tupesiseselt manustatavaid ravimeid ega pesta seebiga. Uuringud on näidanud, et Pharmatex ei kahjusta kondoomi kvaliteeti.

Rasedus ja imetamine

Enne ravimi kasutamist pidage nõu oma arstiga.

Ravim on mõeldud raseduse vältimiseks.

3. KUIDAS PHARMATEX'I KASUTADA

Kasutage Pharmatex'i alati täpselt nii nagu selles infolehes on õpetatud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Ravimit kasutatakse tupesiseselt enne igat suguühet sõltumata menstruaaltsükli päevast. Kreemi manustamisel kinnitatakse tuubi otsa dosaator, mis tuleb täita märgini, jälgides, et ei tekiks õhumulle. Seejärel tuub eemaldatakse ja dosaatoris olev kreem viiakse sügavale tuppe, vajutades aeglaselt dosaatori kolvile. Dosaator eemaldatakse tupest. Kreemi toime saabub kohe ja kestab 10 tundi. Korduvate vahekordade puhul viia tuppe uus kreemiannus. Kasutamishendit tuleb jälgida väga täpselt!

Kui teil on tunne, et Pharmatex'i toime on liiga tugev või liiga nõrk, pidage nõu oma arstiga.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arstiga.

4. VÕIMALIKUD KÕRVALTOIMED

Nagu kõik ravimid, võib ka Pharmatex põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Ravim võib üksikutel juhtudel põhjustada allergiat.

Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet, mida selles infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest arstile.

5. KUIDAS PHARMATEX'I SÄILITADA

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Hoida temperatuuril kuni 25 °C.

Ärge kasutage Pharmatex'i pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbile ja tuubile. Kõlblikkusaeg viitab kuu viimasele päevale.

Ravimeid ei tohi ära visata kanalisatsiooni kaudu ega koos majapidamisprügiga. Küsige oma apteekrilt, kuidas hävitatakse ravimeid, mida enam ei vajata. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

6. LISAINFO

Mida Pharmatex sisaldab:

- Toimeaine on bensalkooniumkloriid. 72 g tupekreemi (1 tuub) sisaldab toimeainena 864 mg bensalkooniumkloriidi. 1 g tupekreemi sisaldab 12 mg bensalkooniumkloriidi.
- Abiained on:veevaba sidrunhape, naatriumvesinikfosfaat, makrogool- ja etüleenglükoolstearaat, lavendliõli ja puhastatud vesi.

Kuidas Pharmatex välja näeb ja pakendi sisu

72 g valget värvi kreemi tuubis ja dosaator.

Müügiloa hoidja:

Laboratoire Innotech International
22 avenue Aristide Briand
94110 ARCUEIL
France

Tootja:

Innothera Chouzy
22 avenue Aristide Briand
94110 ARCUEIL
Prantsusmaa

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.

OÜ Retlando
Aisa 8
80017 Pärnu
Tel. 5136092

Infoleht on viimati koostöölstatud: detsembris 2013