

PAKENDI INFOLEHT: INFORMATSIOON KASUTAJALE

Pharmatex, 18,9 mg vaginaalsuposiidid Bensalkooniumkloriid

Lugege infolehte hoolikalt, sest siin on teile vajalikku teavet.

Ehkki seda ravimit on võimalik osta ilma retseptita, peate parima ravitulemuse saamiseks kasutama Pharmatex'i täpselt juhistele vastavalt.

- Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
- Lisainformatsiooni saamiseks pidage nõu oma apteekriga.
- Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks, või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet, mida selles infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile või apteekrile.

Infolehes antakse ülevaade:

1. Mis ravim on Pharmatex ja milleks seda kasutatakse
2. Mida on vaja teada enne Pharmatex'i kasutamist
3. Kuidas Pharmatex'i kasutada
4. Võimalikud kõrvaltoimed
5. Kuidas Pharmatex'i säilitada
6. Lisainfo

1. MIS RAVIM ON PHARMATEX JA MILLEKS SEDA KASUTATAKSE

Pharmatex'i kasutamine võimaldab hoiduda rasestumisest, kuid ei anna 100% kaitset. Ravimi kontratseptiivne efektiivsus sõltub eelkõige selle õigest kasutamisest.

Rasestumisvastane ravim, mis sobib eriti hästi järgmistel juhtudel: rasestumisvastaste tablettide või emakasisese vahendi kasutamine on vastunäidustatud; suguelu on ebaregulaarne; sünnitus- või abordijärgsel perioodil; rinnaga toitmise ajal; menopausieelsel perioodil; suukaudsete tablettide kasutamise puhul, kui tableti võtmine on hilinenud. Viimasel juhul tuleks kasutada Pharmatex'i koos suukaudsete tablettidega kuni menstruatsioonitsükli lõpuni. Võib kasutada ka täiendavalt koos emakasisese spiraaliga.

Näidustused. Raseduse vältimine.

2. MIDA ON VAJA TEADA ENNE PHARMATEX'I KASUTAMIST

Ärge kasutage Pharmatex'i

- kui te olete allergiline (ülitundlik) bensalkooniumkloriidi või Pharmatex'i mõne koostisosa suhtes
- kui te kasutate samaaegselt teisi tupesiseselt manustatavaid ravimeid
- vahetult enne ja pärast sugühet ei tohi pesta seebiga.

Eriline ettevaatus on vajalik ravimiga Pharmatex

Rasestumisvastane toime sõltub eelkõige õigest kasutamisest. Kasutatakse enne igat sugühet sõltumata menstruatsioonitsükli päevast. Korduva sugühte korral tuleb alati manustada uus annus. Pharmatex'i kasutades ei tohi enne ja pärast sugühet kasutada pesemiseks seepi, kuna

viimane katkestab bensalkooniumkloriidi toime. **Väline tualett on lubatud ainult puhta veega või spetsiaalse seebialust mittesisaldava Pharmatex pesemisvahendiga.** Haavandite tekkimisel välissuguelunditele ravimi kasutamine lõpetada.

Tähelepanu! Ei kaitse suguhaigustesse nakatumise eest!

Ainult tupesiseseks manustamiseks.

Kasutamine koos teiste ravimitega

Palun informeerige oma apteekrit kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud mingeid muid ravimeid, kaasa arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid.

Pharmatex'iga üheaegselt ei tohi kasutada teisi tupesiseselt manustatavaid ravimeid ega pesta seebiga. Uuringud on näidanud, et Pharmatex ei kahjusta kondoomi kvaliteeti.

Rasedus ja imetamine

Enne ravimi kasutamist pidage nõu oma arstiga.

Ravim on mõeldud raseduse vältimiseks.

3. KUIDAS PHARMATEX'I KASUTADA

Kasutage Pharmatex'i alati täpselt nii nagu selles infolehes on õpetatud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Ravimit kasutatakse tupesiseselt enne igat suguühet sõltumata menstruaatsioonitsükli päevast. Vaginaalsuposiit (tupeküünal) vabastatakse pakendist ja viiakse tuppe 5 minutit enne suguühet, soovitatavalt lamavas asendis. Toime kestab **4 tundi**. Korduvate vahekordade puhul viia tuppe kindlasti uus tupeküünal. Kasutamish juhendit tuleb jälgida väga täpselt!

Kui teil on tunne, et Pharmatex'i toime on liiga tugev või liiga nõrk, pidage nõu oma arstiga.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arstiga.

4. VÕIMALIKUD KÕRVALTOIMED

Nagu kõik ravimid, võib ka Pharmatex põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Ravim võib üksikutel juhtudel põhjustada allergiat.

Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet, mida selles infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest arstile.

5. KUIDAS PHARMATEX'I SÄILITADA

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

See ravimpreparaat ei vaja säilitamisel eritingimusi.

Ärge kasutage Pharmatex'i pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbile. Kõlblikkusaeg viitab kuu viimasele päevale.

Ravimeid ei tohi ära visata kanalisatsiooni kaudu ega koos majapidamisprügiga. Küsige oma apteekrilt, kuidas hävitatakse ravimeid, mida enam ei vajata. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

6. LISAINFO

Mida PHARMATEX sisaldab:

- Toimeaine on bensalkooniumkloriid. Üks vaginaalsuposiit sisaldab toimeainena 18,9 mg bensalkooniumkloriidi.
- Abiained on: hüdroksüpropüülselluloos, poolsünteetiline glütseriid (Witepsol S51).

Kuidas PHARMATEX välja näeb ja pakendi sisu

10 vaginaalsuposiiti karbis.
Valged pilklikud vaginaalsuposiidid.

Müügiloa hoidja:

Laboratoire Innotech International
7/9, avenue François Vincent Raspail
94110 Arcueil
22 avenue Aristide Briand
94110 Arcueil
Prantsusmaa

Tootja:

Innothera Chouzy
Rue Rene Chantereau, L'Isle Vert
41150 Chouzy-sur-Cisse
Prantsusmaa

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.

OÜ Retlando
Aisa 8
80017 Pärnu
Tel. 5136092

Infoleht on viimati koostöölstatud: veebruaris 2011.