

Pakendi infoleht: teave patsiendile

Oftan Akvakol 5 mg/ml silmatilgad, lahus Klooramfenikool

Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

- Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
- Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti või apteekriga.
- Ravim on välja kirjutatud üksnes teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik, isegi kui haigusnähud on sarnased.
- Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.

Infolehe sisukord

1. Mis ravim on Oftan Akvakol ja milleks seda kasutatakse
2. Mida on vaja teada enne Oftan Akvakol'i kasutamist
3. Kuidas Oftan Akvakol'i kasutada
4. Võimalikud kõrvaltoimed
5. Kuidas Oftan Akvakol'i säilitada
6. Pakendi sisu ja muu teave

1. Mis ravim on Oftan Akvakol ja milleks seda kasutatakse

Oftan Akvakol silmatilgad sisaldavad klooramfenikooli. See ennetab silmapõletikke põhjustavate bakterite kasvu.

Oftan Akvakol'i kasutatakse bakteriaalsete silmapõletike raviks. Seda võib kasutada ka põletike ennetamiseks seoses silmakahjustuste ja operatsioonidega.

Seda ravimit võivad kasutada nii täiskasvanud kui lapsed.

2. Mida on vaja teada enne Oftan Akvakol'i kasutamist

Ärge kasutage Oftan Akvakol'i:

- kui olete klooramfenikooli või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline.
- kui teil on isiklikus või perekonna anamneesis teadaolev vere düskraasia, näiteks aplastiline aneemia.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Enne Oftan Akvakol'i kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Muud ravimid ja Oftan Akvakol

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud või kavatsete kasutada mis tahes muid ravimeid.

Kui te peate manustama samasse silma mitut ravimit, oodake vähemalt 5 minutit enne teise ravimi manustamist. Silmasalv tuleb alati manustada viimasena.

Oftan Akvakol'i ei tohi kasutada samaaegselt ravimitega, mis võivad pärssida luuüdi funktsiooni.

Rasedus ja imetamine

Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arsti või apteekriga.

Raseduse ja imetamise ajal peab klooramfenikooli kasutama ettevaatusega.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Pärast silmatilkade kasutamist, võib teil tekkida ajutine hägune nägemine. Ärge juhtige autot ega käsitsege masinaid kuni teie nägemine on selge. Kui te kahtlete, rääkige oma arsti või apteekriga.

Oftan Akvakol sisaldab bensalkooniumkloriidi

Oftan Akvakol silmatilgad sisaldavad säilitusainena bensalkooniumkloriidi, mis võib põhjustada kontaktläätsede värvuse muutust. Bensalkooniumkloriid võib põhjustada silmaärritust.

Kontaktläätsed

Kontaktläätsede kandmist põletikulises silmas tuleb vältida, kuna infektsiooni paranemine võib kesta kauem või võib halveneda.

3. Kuidas Oftan Akvakol'i kasutada

Kasutage seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst või apteeker on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Alguses on soovitatav annus üks tilk 6...8 korda päevas; kui sümptomid vähenevad, võib annust järkjärgult vähendada.

Enne silmatilkade manustamist:


- peske käed,
- valige tilkade tilgutamiseks kõige mugavam asend (nt istudes, seliliasendis, seistes peegli ees)

Manustamine:

1. Avage pudel. Pudeli sisu saastumisest hoidumiseks ärge laske pudeli otsikul puutuda kokku mingite pindadega.
2. Kallutage pea kuklasse ja asetage pudel kohakuti silmaga.



3. Tõmmake alumist silmalaugu alla, vaadake üles ja pigistage pudelit kuni tilk kukub silma.



4. Sulgege silm ja vajutage nimetissõrmega silma sisemisele nurgale umbes minuti jooksul. Sellega hoiate ära silmatilkade valgumise ninaneelu. Sulgege pudel.



Kui te kasutate nii silmatilkasid kui silmasalvi, manustage salvi viimasena. Kui te peate manustama samasse silma mitut ravimit, oodake vähemalt 5 minutit enne teise ravimi manustamist.

Kasutamine lastel

Lapsed võivad seda ravimit kasutada samamoodi kui täiskasvanud.

Lapsed

Annuse kohandamine võib olla vajalik vastsündinutel, kuna ebaküpse metabolismi tõttu on süsteemne eritumine vähenenud ning esineb risk annusest sõltuvate kõrvaltoimete tekkeks. Maksimaalne ravikestus on 10...14 päeva.

Kui te kasutate Oftan Akvakol'i rohkem kui ette nähtud

Kui te manustate tilkasid liiga palju, voolab liigne kogus välja ning ei põhjusta eriti mingeid sümptomeid.

Kui te unustate Oftan Akvakol'i kasutada

Ärge kasutage kahekordset annust, kui annus jäi eelmisel korral manustamata.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

4. Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki. Oftan Akvakol silmatilgad on hästi talutavad.

Sage (võib mõjutada kuni 1 inimest 100-st):

- allergilised reaktsioonid
- mööduv silmaärritus nagu sügelus, põletustunne, torkiv tunne või konjunktivaalne hüperemia, superinfektsioonid.

Harv (võib mõjutada kuni 1 inimest 1000-st):

- perifeerne neuropaatia
- nägemisnärv neuriiit.

Väga harv (võib mõjutada kuni 1 inimest 10000-st):

- Luuüdi depressiooni kaks vormi: 1. annusest sõltuv pöörduv luuüdi depressioon, millega kaasnevad luuüdi morfoloogilised muutused; 2. raske pöördumatu aplastiline aneemia (annusest mitesõltuv)
- Allergiline konjunktiviit.

Teised kõrvaltoimed:

Teised kõrvaltoimed on esinenud väiksel arvul inimestel, kuid nende sagedus on teadmata:

- anafülaktilised reaktsioonid;
- angioneurootiline turse, urtikaaria, vesikulaarne ja makulopapulaarne dermatiit.

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

5. Kuidas Oftan Akvakol'i säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.
Hoida külmkapis (2°C...8°C).

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud pakendil. Kõlblikkusaeg viitab sellele kuu viimasele päevale.

Pärast pudeli esmast avamist on kõlblikkusaeg 28 päeva. Avatud pudel hoida toatemperatuuril (kuni 25°C). Hoida pudel tihedalt suletuna.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

6. Pakendi sisu ja muu teave

Mida Oftan Akvakol sisaldab

- Toimeaine on klooramfenikool. 1 ml lahust sisaldab 5 mg klooramfenikooli.
- Abiained on bensalkooniumkloriid (säilitusaine), boorhape, booraks, polüsorbaat 80, süstevesi.

Kuidas Oftan Akvakol välja näeb ja pakendi sisu

Selge ja värvitu kuni kergelt kollakas lahus. Valge LDPE 10 ml pudel HDPE korgiga.

Müügiloo hoidja ja tootja

Santen Oy
Niittyhaankatu 20
33720 Tampere
Soome

Infoleht on viimati uuendatud juunis 2016.