

## **Pakendi infoleht: teave patsiendile**

### **Käsिमүүgiravim\***

#### **Lamisil DermGel, 1% geel** Terbinafiin

#### **Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.**

Kasutage seda ravimit alati täpselt nii, nagu on kirjeldatud selles infolehes või nagu arst või apteeker või meditsiiniõde on teile selgitanud.

- Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
- Lisateabe saamiseks pidage nõu oma apteekriga.
- Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4
- Kui pärast 14 päeva möödumist te ei tunne end paremini või tunnete end halvemini, peate võtma ühendust arstiga

#### **Infolehe sisukord:**

1. Mis ravim on Lamisil DermGel ja milleks seda kasutatakse
2. Mida on vaja teada enne Lamisil DermGel'i kasutamist
3. Kuidas Lamisil DermGel'i kasutada
4. Lamisil DermGel'i võimalikud kõrvaltoimed
5. Kuidas Lamisil DermGel'i säilitada
6. Pakendi sisu ja muu teave

#### **1. Mis ravim on Lamisil Dermgel ja milleks seda kasutatakse**

Lamisil on seenevastase toimega geel, mis hävitab nahahaigust põhjustavad seened. Lamisil DermGel'i kasutatakse jala seenhaiguse raviks (*tinea pedis*).

Lamisil DermGel'i toime kestab kaua. Kui geeli kasutada vastavalt ettekirjutustele, täheldatakse ainult 10%-l jalanaha seenhaigusega patsientidest haiguse taaspuhkemist.

#### **Kuidas Lamisil Dermgel toimib**

**Jalanaha seenhaigus** esineb ainult labajalgadel (tavaliselt mõlemal, kuid mitte alati), sageli varvaste vahel. Haigus võib esineda jalaseljal, kandadel või teistes labajala piirkondades. Haigussümptomiteks on naha lõhenemine või ketendus, kuid tekkida võib ka kerge turse, vesivillid või leemendavad haavandid.

Kui teil aga esineb küünte seenhaigus (seen küünes või selle all), millele on iseloomulik küünte värvuse ja struktuuri muutus (paksud, kihistunud küüned), tuleb pöörduda arsti poole, kuna Lamisil DermGel ei sobi seda tüüpi seenhaiguse raviks.

#### **2. Mida on vaja teada enne Lamisil Dermgel'i kasutamist**

##### **Ärge kasutage Lamisil Dermgel'i**

- kui te olete allergiline (ülitundlik) terbinafiini või ravimi mis tahes koostisosa (loetletud lõigus 6) suhtes.

##### **Hoiatused ja ettevaatusabinõud**

Enne Lamisil Dermgel'i kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga.

- Kreemi kasutada ainult välispidiselt.
- Mitte kasutada suus või alla neelata.
- Vältida kontakti näo, silmade või kahjustatud nahaga (märgatavalt turses nahapiirkonnad), millele

\* Selgitus: 15 g pakend - käsिमүүgiravim; 30 g pakend - retseptiravim

alkohol võib olla ärritava toimega. Kui geel peaks kogemata silma sattuma, pühkige see ära ja loputage silma hoolikalt puhta veega. Kui ebamugavustunne püsib, pöörduge arsti poole.

### **Lapsed ja noorukid**

Ebapiisavate ohutus- ja efektiivsusandmete tõttu, ei ole Lamisil Dermgel'i kasutamine lastel ja alla 18-aastastel noorukitel soovitatav.

### **Muud ravimid ja Lamisil Dermgel**

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud või kavatsete kasutada mis tahes muid ravimeid. Ärge kasutage samaaegselt teisi ravimeid kahjustatud nahapiirkonnal.

### **Rasedus, imetamine ja fertiilsus**

Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arsti või apteekriga.

Mitte kasutada raseduse ajal, välja arvatud juhul kui see on selgelt näidustatud.

Ärge kasutage Lamisil Dermgel'i rinnaga toitmise ajal.

Imik ei tohi sattuda kontakti ema ravitava nahapiirkonnaga, kaasa arvatud ema rinnad.

### **Autojuhtimine ja masinatega töötamine**

Lamisil DermGel ei mõjuta autojuhtimise ega masinate käsitlemise võimet.

### **Oluline teave mõningate Lamisil DermGel'i koostisainete suhtes**

Lamisil Dermgel sisaldab butüülhüdrosütolueeni (E321), mis võib põhjustada lokaalseid nahareaktsioone (nt kontaktdermatiiti) või silmade ja limaskestade ärritust.

## **3. Kuidas Lamisil Dermgel'i kasutada**

Kasutage seda ravimit alati täpselt nii, nagu on kirjeldatud selles infolehes või nagu arst või apteeker on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Oluline on kasutada Lamisil Dermgel'i õigesti. Järgige juhiseid.

Kui teil aga esineb küünte seenhaigus (seen küünes või selle all), millele on iseloomulik küünte värvuse ja struktuuri muutus (paksud, kihistunud küüned), tuleb pöörduda arsti poole, kuna Lamisil ei sobi seda tüüpi seenhaiguste raviks. Küüne seenhaiguse raviks tuleb kasutada Lamisil tablette, mis on saadaval vaid retseptiga.

### **Kasutamishüüdnised:**

Täiskasvanud:

- Peske ja kuivatage käed ja ravitav nahapiirkond.
- Avage tuub, esmakordsel kasutamisel torgake aval olev kate läbi korgil oleva teravikuga ja pigistage tuubi.
- Kandke õhuke kiht geeli kahjustatud nahapiirkonnale ja selle ümbrusesse.
- Hõõruge geel kergelt naha sisse.
- Sulgege tuub korgiga.
- Peske käsi pärast kahjustatud nahapiirkonna puutumist, et nakkus ei leviks teistesse nahapiirkondadesse või teistele inimestele.

### **Kui tihti ja kui kaua tuleb Lamisil Dermgel'i kasutada**

Jalalaba seenhaiguste (*tinea pedis*) raviks kasutatakse Lamisil Dermgel'i 1 kord päevas 1 nädala jooksul.

Jätkake geeli kasutamist soovitatud ajavahemiku jooksul, isegi kui haigusümptomid paari päeva jooksul taanduvad. Paranemist on märgata juba mõne päeva pärast, kuid infektsioon võib ilmneda uuesti kui kreemi ei kasutata regulaarselt või ravi lõpetatakse liiga vara.

**Lamisil DermGel'i toimel on paranemine märgatav juba paari päeva pärast.** Kahjustatud naha täielik paranemine võtab aega kauem, isegi kuni 4 nädalat. Lamisil DermGel'i toime jätkub pärast selle kasutamise lõppu. Paranemisprotsess jätkub vaatamata sellele, et te geeli ei kasuta.

Kui haigusümptomid ei ole 2 nädala jooksul taandunud, tuleb pöörduda arsti poole.

#### **Paranemise soodustamine**

Paranemist soodustab see, kui hoiate ravitava nahapiirkonna puhtana, pestes seda regulaarselt. Kuivatage ettevaatlikult ilma hõõrumata. Sügelusele vaatamata püüdke vastavat piirkonda mitte kratsida, kuna see suurendab nahakahjustust ja aeglustab paranemisprotsessi või põhjustab nakkuse levikut.

Kuna need nakkused võivad levida teistele inimestele, ei tohi teie käterätti ega riideid kasutada keegi peale teie enda. Et kaitsta ennast taasnakatumise eest, peske neid tihti.

#### **Kui te kasutate Lamisil Dermgel'i rohkem kui ette nähtud**

Kui teie või keegi teine peaks kogemata geeli alla neelama, informeerige sellest oma arsti, kes ütleb, mida teha.

#### **Kui te unustate Lamisil Dermgel'i kasutada**

Kui te unustate Lamisil DermGel'i manustada, tehke seda niipea kui võimalik ja seejärel jätkake nagu tavaliselt. Kui on juba käes järgmise manustamise aeg, siis manustage ettenähtud kogus ja seejärel jätkake nagu tavaliselt.

Tähtis on kinni pidada geeli manustamise ettenähtud aegadest, sest vahelejäänud manustamiskorrad võivad suurendada haiguse taaspuhkemise ohtu.

#### **4. Võimalikud kõrvaltoimed**

Nagu kõik ravimid, võib ka Lamisil DermGel põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki. Enamik inimesi saavad Lamisil Dermgel'i kasutamisest abi.

Lõpetage Lamisili kasutamine ja otsige otsekohe arstiabi, kui teil ilmneb mõni järgmistest sümptomitest, kuna need võivad viidata allergilise reaktsiooni tekkele:

- Hingamis- või neelamisraskused
- Näo, huulte, keele- või kurguturse
- Raske naha sügelus punetava ja punnilise lööbega.

**Mõned kõrvaltoimed esinevad sageli** (võivad mõjutada kuni 1 inimest 10-st):

Nahakoorumine, sügelus

**Mõned kõrvaltoimed esinevad aeg-ajalt** (võivad mõjutada kuni 1 inimest 100-st):

Kolded või kärnad nahal, nahakahjustused, naha värvuse muutused, punetus, valu, valu ja ärritus manustamiskohas.

**Mõned kõrvaltoimed esinevad harva** (võivad mõjutada kuni 1 inimest 1000-st):

Nahakuivus, ekseem.

Lamisil Dermgel'i ekslikul manustamisel silma, võib esineda silmade ärritus.

\* Selgitus: 15 g pakend - käsimüügiravim; 30 g pakend - retseptiravim

## **Kõrvaltoimetest teavitamine**

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekri või meditsiiniõega. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada [www.ravimiamet.ee](http://www.ravimiamet.ee) kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

## **5. Kuidas Lamisil Dermgel'i säilitada**

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Hoida tuubi suletuna välispakendis temperatuuril kuni 30°C.

Hoidke tuubi suletuna. 16 nädala möödumisel pärast esmast avamist tuleb järelejäänud ravim ära visata.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil pärast "Kõlblik kuni:".

Kõlblikkusaeg viitab kuu viimasele päevale.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

## **6. Pakendi sisu ja muu teave**

### **Mida Lamisil Dermgel sisaldab:**

Toimeaine on terbinafiin. 1 g geeli sisaldab 10 mg (1%) terbinafiini.

Abiained on puhastatud vesi, 96%-line etanool, isopropüülmüristaat, polüsorbaat 20, karbomeer, sorbitaanlaureaat, bensüülalkohol, naatriumhüdrosiid, butüülhüdrosütolueen (E321).

### **Kuidas Lamisil Dermgel välja näeb ja pakendi sisu**

Lamisil DermGel on saadaval membraaniga kaetud alumiiniumtuubis või lamineeritud tuubis, mis on seestpoolt kaetud epoksüfenoolvaigu lakiga. Tuub on suletud keeratava polüpropüleenkorgiga. Lamisil DermGel on valge kuni valkjas läikiv geel.

Tuubis on 15 g geeli (käsimüügiravim).

### **Müügiloa hoidja ja tootja**

#### **Müügiloa hoidja**

GlaxoSmithKline Consumer HealthCare (UK) Trading Ltd.

980 Great West Road, Brentford

Middlesex, TW8 9GS

Ühendkuningriik

#### **Tootja**

Novartis Consumer Health GmbH,

Zielstattstrasse 40,

81379 München,

Saksamaa.

GSK Consumer Healthcare GmbH & Co. KG

Barthstraße 4

80339 München,

Saksamaa

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole:

GlaxoSmithKline Eesti OÜ

\* Selgitus: 15 g pakend - käsimüügiravim; 30 g pakend - retseptiravim

Tel.: +372 6676 900  
[estonia@gsk.com](mailto:estonia@gsk.com)

**Infoleht on viimati koostõlastatud oktoobris 2016.**

\* Selgitus: 15 g pakend - käsimüügiravim; 30 g pakend - retseptiravim

## Pakendi infoleht: teave patsiendile

### Retseptiravim\*

#### Lamisil DermGel, 1% geel Terbinafiin

#### Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

- Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
- Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti või apteekriga.
- Ravim on välja kirjutatud üksnes teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik, isegi kui haigusnähud on sarnased.
- Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud.

#### Infolehe sisukord:

1. Mis ravim on Lamisil DermGel'i ja milleks seda kasutatakse
2. Mida on vaja teada enne Lamisil DermGel'i kasutamist
3. Kuidas Lamisil DermGel'i kasutada
4. Lamisil DermGel'i võimalikud kõrvaltoimed
5. Kuidas Lamisil DermGel'i säilitada
6. Pakendi sisu ja muu teave

#### 1. Mis ravim on Lamisil Dermgel ja milleks seda kasutatakse

Lamisil on seenevastase toimega geel, mis hävitab nahahaigust põhjustavad seened.

Lamisil DermGel'i kasutatakse dermatofüütide poolt põhjustatud naha seeninfektsioonide (*tinea pedis*, *tinea cruris*, *tinea corporis*) raviks.

Samuti kasutatakse seda ravimit naha pärmseente (*Malassezia furfur*) poolt põhjustatud nahahaiguse *Pityriasis versicolor* raviks.

#### 2. Mida on vaja teada enne Lamisil Dermgel'i kasutamist

##### Ärge kasutage Lamisil Dermgel'i

- kui te olete allergiline (ülitundlik) terbinafiini või ravimi mis tahes koostisosa (loetletud lõigus 6) suhtes.

##### Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Enne Lamisil Dermgel'i kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga.

- Kreemi kasutada ainult välispidiselt.
- Mitte kasutada suus või alla neelata.
- Vältida kontakti näo, silmade või kahjustatud nahaga (märgatavalt turses nahapiirkonnad), millele alkohol võib olla ärritava toimega. Kui geel peaks kogemata silma sattuma, pühkige see ära ja loputage silma hoolikalt puhta veega. Kui ebamugavustunne püsib, pöörduge arsti poole.

##### Lapsed ja noorukid

Ebapiisavate ohutus- ja efektiivsusandmete tõttu, ei ole Lamisil Dermgel'i kasutamine lastel ja alla 18-aastastel noorukitel soovitatav.

##### Muud ravimid ja Lamisil Dermgel

\* Selgitus: 15 g pakend - käsimüügiravim; 30 g pakend - retseptiravim

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud või kavatsete kasutada mis tahes muid ravimeid. Ärge kasutage samaaegselt teisi ravimeid kahjustatud nahapiirkonnal.

#### **Rasedus, imetamine ja fertiilsus**

Imik ei tohi sattuda kontakti ema ravitava nahapiirkonnaga, kaasa arvatud ema rinnad.

Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arsti või apteekriga.

Mitte kasutada raseduse ajal, välja arvatud juhul kui see on selgelt näidustatud.

Ärge kasutage Lamisil Dermgel'i rinnaga toitmise ajal.

#### **Autojuhtimine ja masinatega töötamine**

Lamisil DermGel ei mõjuta autojuhtimise ega masinate käsitlemise võimet.

#### **Oluline teave mõningate Lamisil DermGel'i koostisainete suhtes**

Lamisil Dermgel sisaldab butüülhüdrosütolueeni (E321), mis võib põhjustada lokaalseid nahareaktsioone (nt kontaktdermatiiti) või silmade ja limaskestade ärritust.

### **4. Kuidas Lamisil Dermgel'i kasutada**

Kasutage seda ravimit alati täpselt nii, nagu on kirjeldatud selles infolehes või nagu arst või apteeker on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Oluline on kasutada Lamisil Dermgel'i õigesti. Järgige juhiseid.

Kui teil aga esineb küünte seenhaigus (seen küünes või selle all), millele on iseloomulik küünte värvuse ja struktuuri muutus (paksud, kihistunud küüned), tuleb pöörduda arsti poole, kuna Lamisil ei sobi seda tüüpi seenhaiguste raviks. Küünte seenhaiguse raviks tuleb kasutada Lamisil tablette, mis on saadaval vaid retseptiga.

#### **Kasutamishüüanded:**

Täiskasvanud:

- Peske ja kuivatage käed ja ravitav nahapiirkond.
- Avage tuub, esmakordsel kasutamisel torgake aval olev kate läbi korgil oleva teravikuga ja pigistage tuubi.
- Kandke õhuke kiht geeli kahjustatud nahapiirkonnale ja selle ümbrusesse.
- Hõõruge geel kergelt naha sisse.
- Sulgege tuub korgiga.
- Peske käsi pärast kahjustatud nahapiirkonna puutumist, et nakkus ei leviks teistesse nahapiirkondadesse või teistele inimestele.

Kui infektsioon on voldilises nahapiirkonnas, võib selle katta näiteks marliga, eriti ööseks. Kasutage selleks igal korral puhast marlit.

#### **Kui tihti ja kui kaua tuleb Lamisil Dermgel'i kasutada**

- Naha seeninfektsioonid kehal, jalaäärtel või labajalgadel (Tinea corporis, tinea cruris, tinea pedis): 1 kord päevas 1 nädala kestel

- Naha pärmseente infektsioon (Pityriasis versicolor): 2 korda päevas 1 nädala kestel

Jätkake geeli kasutamist soovitatud ajavahemiku jooksul, isegi kui haigussümptomid paari päeva jooksul taanduvad. Paranemist on märgata juba mõne päeva pärast, kuid infektsioon võib ilmneda uuesti kui kreemi ei kasutata regulaarselt või ravi lõpetatakse liiga vara.

\* Selgitus: 15 g pakend - käsimüügiravim; 30 g pakend - retseptiravim

**Lamisil DermGel'i toimel on paranemine märgatav juba paari päeva pärast.** Kahjustatud naha täielik paranemine võtab aega kauem, isegi kuni 4 nädalat. Lamisil DermGel'i toime jätkub pärast selle kasutamise lõppu. Paranemisprotsess jätkub vaatamata sellele, et te geeli ei kasuta.

Kui haigussümptomid ei ole 2 nädala jooksul taandunud, tuleb pöörduda arsti poole.

#### **Paranemise soodustamine**

Paranemist soodustab see, kui hoiate ravitava nahapiirkonna puhtana, pestes seda regulaarselt. Kuivatage ettevaatlikult ilma hõõrumata. Sügelusele vaatamata püüdke vastavat piirkonda mitte kratsida, kuna see suurendab nahakahjustust ja aeglustab paranemisprotsessi või põhjustab nakkuse levikut.

Kuna need nakkused võivad levida teistele inimestele, ei tohi teie käterätti ega riideid kasutada keegi peale teie enda. Et kaitsta ennast taasnakatamise eest, peske neid tihti.

#### **Kui te kasutate Lamisil Dermgel'i rohkem kui ette nähtud**

Kui teie või keegi teine peaks kogemata geeli alla neelama, informeerige sellest oma arsti, kes ütleb, mida teha.

#### **Kui te unustate Lamisil Dermgel'i kasutada**

Kui te unustate Lamisil DermGel'i manustada, tehke seda niipea kui võimalik ja seejärel jätkake nagu tavaliselt. Kui on juba käes järgmise manustamise aeg, siis manustage ettenähtud kogus ja seejärel jätkake nagu tavaliselt.

Tähtis on kinni pidada geeli manustamise ettenähtud aegadest, sest vahelejäänud manustamiskorrad võivad suurendada haiguse taaspuhkemise ohtu.

#### **4. Võimalikud kõrvaltoimed**

Nagu kõik ravimid, võib ka Lamisil DermGel'i põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki. Enamik inimesi saavad Lamisil Dermgel'i kasutamisest abi.

Lõpetage Lamisili kasutamine ja otsige otsekohe arstiabi, kui teil ilmneb mõni järgmistest sümptomitest, kuna need võivad viidata allergilise reaktsiooni tekkele:

- Hingamis- või neelamisraskused
- Näo, huulte, keele- või kurguturse
- Raske naha sügelus punetava ja punnilise lööbega.

**Mõned kõrvaltoimed esinevad sageli** (võivad mõjutada kuni 1 inimest 10-st):

Nahakoorumine, sügelus

**Mõned kõrvaltoimed esinevad aeg-ajalt** (võivad mõjutada kuni 1 inimest 100-st):

Kolded või kärnad nahal, nahakahjustused, naha värvuse muutused, punetus, valu, valu ja ärritus manustamiskohas.

**Mõned kõrvaltoimed esinevad harva** (võivad mõjutada kuni 1 inimest 1000-st):

Nahakuivus, ekseem.

Lamisil Dermgel'i ekslikul manustamisel silma, võib esineda silmade ärritus.

#### **Kõrvaltoimetest teavitamine**

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekri või meditsiiniõega. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada [www.ravimiamet.ee](http://www.ravimiamet.ee) kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

\* Selgitus: 15 g pakend - käsimüügiravim; 30 g pakend - retseptiravim



## 5. Kuidas Lamisil Dermgel'i säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.  
Hoida temperatuuril kuni 30°C.

Hoidke tuubi suletuna. 16 nädala möödumisel pärast esmast avamist tuleb järelejäänud ravim ära visata.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil pärast "Kõlblik kuni:".  
Kõlblikkusaeg viitab kuu viimasele päevale.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

## 6. Pakendi sisu ja muu teave

### Mida Lamisil Dermgel sisaldab:

Toimeaine on terbinafiin. 1 g geeli sisaldab 10 mg (1%) terbinafiini.  
Abiained on puhastatud vesi, 96%-line etanool, isopropüülmüristaat, polüsorbaat 20, karbomeer, sorbitaanlaureaat, bensüülalkohol, naatriumhüdroksiid, butüülhüdroksütolueen (E321).

### Kuidas Lamisil Dermgel välja näeb ja pakendi sisu

Lamisil DermGel on saadaval membraaniga kaetud alumiinium tuubis või lamineeritud tuubis, mis on seestpoolt kaetud epoksüfenoolvaigu lakiga. Tuub on suletud keeratava polüpropüleen korgiga. Lamisil DermGel on valge kuni valkjass läikiv geel.

Tuubis on 30 g (retseptiravim) geeli.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla saadaval.

### Müügiloo hoidja ja tootja

#### Müügiloo hoidja

GlaxoSmithKline Consumer HealthCare (UK) Trading Ltd.  
980 Great West Road, Brentford  
Middlesex, TW8 9GS  
Ühendkuningriik

#### Tootja

Novartis Consumer Health GmbH,  
Zielstattstrasse 40,  
81379 München,  
Saksamaa.

GSK Consumer Healthcare GmbH & Co. KG  
Barthstraße 4  
80339 München,  
Saksamaa

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloo hoidja kohaliku esindaja poole.

GlaxoSmithKline Eesti OÜ  
Tel.: +372 6676 900  
[estonia@gsk.com](mailto:estonia@gsk.com)

\* Selgitus: 15 g pakend - käsimüügiravim; 30 g pakend - retseptiravim

**Infoleht on viimati kooskõlastatud oktoobris 2016.**

\* Selgitus: 15 g pakend - käsimüügiravim; 30 g pakend - retseptiravim