

Pakendi infoleht: teave kasutajale

BISACODYL-GRINDEKS, 5 mg gastroresistentsed tabletid Bisakodüül

Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

Kasutage seda ravimit alati täpselt nii, nagu on kirjeldatud selles infolehes või nagu arst või apteeker on teile selgitanud.

- Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
- Lisateabe saamiseks pidage nõu oma apteekriga.
- Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.
- Kui pärast 5 päeva möödumist te ei tunne end paremini või tunnete end halvemini, peate võtma ühendust arstiga.

Infolehe sisukord

1. Mis ravim on Bisacodyl-Grindeks ja milleks seda kasutatakse
2. Mida on vaja teada enne Bisacodyl-Grindeks'i kasutamist
3. Kuidas Bisacodyl-Grindeks'it kasutada
4. Võimalikud kõrvaltoimed
5. Kuidas Bisacodyl-Grindeks'it säilitada
6. Pakendi sisu ja muu teave

1. Mis ravim on Bisacodyl-Grindeks ja milleks seda kasutatakse

Bisacodyl-Grindeks sisaldab toimeainet bisakodüül. See on sünteetiline lahtisti, mis toimib otse käärsoole limaskestale, suurendab käärsoole silelihaste peristaltilisi kontraktsioone ja põhjustab käärsoole tühjenemist. Kui võtate ravimit päeval, saabub lahtistav toime umbes 6 tunni jooksul, enne magamaminekut võtmisel aga 8...12 tunni jooksul.

Bisacodyl-Grindeks'it kasutatakse:

- kõhukinnisuse lühiajaliseks raviks, kui kõhukinnisus ei ole korrigeeritav dieediga;
- operatsioonide või diagnostiliste protseduuride eel (nt kolonoskoopia, radioloogilised uuringud).

2. Mida on vaja teada enne Bisacodyl-Grindeks'i kasutamist

Ärge kasutage Bisacodyl-Grindeks'it

- kui olete toimeaine või selle ravimi mis tahes koostisosa(de) (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline;
- kui teil on raskusi soole tühjendamisega soole mitteläbitavuse (iileuse) või sooleobstruktsiooni tõttu;
- kui teil on ägedad kirurgilised kõhuõõnehaigused, nagu ussripikupõletik või päraaku veritsus;
- kui teil on raske dehüdratsioon;
- kui teil on äge põletikuline soolehaigus;
- alla 6-aastased lapsed.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Enne Bisacodyl-Grindeks'i kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga.

- Kui te kasutate leeliselisi tooteid või ravimeid. Neid tooteid või ravimeid ei tohi kasutada ka 1 tund enne või pärast Bisacodyl-Grindeks'i kasutamist;
- Kui teil on kõhuvalu, iiveldus ja oksendate.

Nagu teistegi lahtistite puhul, tuleks vältida Bisacodyl-Grindeks'i pikaajalist kasutamist, seetõttu ärge kasutage Bisacodyl-Grindeks'it kauem kui 5 päeva.

Teie arst otsustab, kas te vajate Bisacodyl-Grindeks'it enne operatsiooni või diagnostilist protseduuri.

Lapsed

Bisacodyl-Grindeks'it ei tohi kasutada alla 6-aastastel lastel, sest lapsel on raske tabletti ilma närimata alla neelata.

Muud ravimid ja Bisacodyl-Grindeks

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud või kavatsete kasutada mis tahes muid ravimeid.

Antatsiidide, H₂-histamiini retseptori blokaatorite (nt tsimetidiin, ranitidiin, famotidiin) või prootonpumba inhibiitoriteks nimetatavate ravimite samaaegne kasutamine võib vähendada tabletkatte vastupidavust ja soodustada toimeaine liiga kiiret vabanemist, mis põhjustab mao- ja kaksteistsõrmiku ärritust.

Bisacodyl-Grindeks koos toidu ja joogiga

Bisacodyl-Grindeks'i samaaegne kasutamine koos maomahla happelisust neutraliseerivate leeliseliste toodetega (naatriumvesinikkarbonaat, leeliselised mineraalveed, piim) võib põhjustada seedetrakti limaskesta ärritust.

Rasedus ja imetamine

Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arsti või apteekriga.

Raseduse ja imetamise ajal tohib Bisacodyl-Grindeks'it kasutada vaid arsti juhiste kohaselt.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Bisacodyl-Grindeks ei mõjuta autojuhtimise või masinate käsitlemise võimet.

Bisacodyl-Grindeks sisaldab sahharoosi, laktoosi ja värvainet päikeseloojangukollane (E 110)

Üks Bisacodyl-Grindeks'i tablett sisaldab 19,3 mg sahharoosi ja 81 mg laktoosmonohüdraati. Harvaesineva päriliku fruktoosi või galaktoosi talumatuse, laktaasi defitsiidi, glükoos-galaktoosi malabsorptsiooni või sahharoos-isomaltaasi puudulikkusega patsiendid ei tohi seda ravimit kasutada. Tablettide polümeerikate sisaldab värvainet päikeseloojangukollane (E 110), mis võib põhjustada allergilisi reaktsioone.

3. Kuidas Bisacodyl-Grindeks'it kasutada

Kasutage seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst või apteeker on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Bisacodyl-Grindeks'it võetakse enne magamaminekut. Tabletid tuleb alla neelata tervelt ilma närimata. Toit ei mõjuta imendumist.

Täiskasvanud ja üle 12-aastased lapsed

Kõhukinnisus: ööpäevane annus on 5...15 mg (1...3 tabletti) ühekordse annusena.

Operatsioonide või diagnostiliste protseduuride eel: 10 mg (2 tabletti) enne magamaminekut 2 ööd enne protseduuri.

6...12-aastased lapsed

Kõhukinnisus: ööpäevane annus on 5...10 mg (1...2 tabletti) ühekordse annusena.

Operatsioonide või diagnostiliste protseduuride eel: 5 mg (1 tablett) enne magamaminekut 2 ööd enne protseduuri.

Bisacodyl-Grindeks'it ei tohi kasutada üle 5 päeva **ilma arstiga konsuleerimata**.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Kui te kasutate Bisacodyl-Grindeks'it rohkem kui ette nähtud

Bisakodüüli üleannustamine võib põhjustada tugevat kõhulahtisust, ulatuslikku vee ja elektrolüütide (eriti kaaliumi) kaotust, tekkida võib peen- ja käärsoole põletik, samuti jämesoole atoonia. Bisakodüüli üleannustamise korral võtke kohe ühendust arstiga!

4. Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Bisacodyl-Grindeks on üldiselt hästi talutav.

Siiski võib esineda alljärgnevat kõrvaltoimeid:

Väga harv (esineb vähem kui ühel kasutajal 10 000-st):

- allergilised reaktsioonid, sh üksikjuhtudel angioödeem ja anafülaktilised reaktsioonid;
- kõhuvalu;
- kõhukrambid.

Selle ravimi pikaajalisel kasutamisel võib tekkida:

- nõrkus ja koordinatsioonihäired;
- vererõhu langus;
- kõhulahtisus;
- ulatuslik vee ja elektrolüütide kaotus;
- jämesoole atoonia;
- hüpokaleemia (vere madal kaaliumisisaldus).

Kõrvaltoimed esinevad sagedamini eakatel patsientidel.

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

5. Kuidas Bisacodyl-Grindeks'it säilitada

Hoida temperatuuril kuni 25 °C.

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud pakendile. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

6. Pakendi sisu ja muu teave

Mida Bisacodyl-Grindeks sisaldab

- Toimeaine on bisakodüül.
Üks gastroresistentne tablett sisaldab 5 mg bisakodüüli.
- Teised koostisosad on:

Tableti sisu: sahharoos, laktoosmonohüdraat, kartulitärklis, talk, kaltsiumstearaat, metüültselluloos, polüsorbaat 80;

Tableti polümeerikate: metakrüülhappe-etüülakrülaatkopolümeer, talk, titaandioksiid (E 171), trietüültsitraat, värvaine päikeseloojangukollane (E 110).

Kuidas Bisacodyl-Grindeks välja näeb ja pakendi sisu

Heleoranžid ümarad kaetud kaksikkumerad tabletid. Tablett on murdepinnal valge värvusega.

PVC ja alumiiniumfooliumist blistrid.

10 tabletti blisterpakendis.

4 blisterpakendit (40 tabletti) pappkarbis.

Müügiloa hoidja ja tootja:

AS GRINDEKS.

Krustpils iela 53, Rīga, LV-1057, Läti

Tel.: +371 67083205

Faks: +371 67083505

e-mail: grindeks@grindeks.lv

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole:

AS Grindeks Eesti filiaal

Tondi 33

11316 Tallinn

Tel.: 612 02 24

Faks: 612 0331

Infoleht on viimati uuendatud septembris 2017.