

Pakendi infoleht: teave patsiendile
(käsimüügiravim*)

IMODIUM, 2 mg kõvakapslid
Loperamiidvesinikkloriid

Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

Võtke seda ravimit alati täpselt nii, nagu on kirjeldatud selles infolehes või nagu arst või apteeker on teile selgitanud.

- Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
- Lisateabe saamiseks pidage nõu oma apteekriga.
- Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.
- Kui pärast 2 päeva möödumist te ei tunne end paremini või tunnete end halvemini, peate võtma ühendust arstiga

Infolehe sisukord

1. Mis ravim on IMODIUM ja milleks seda kasutatakse
2. Mida on vaja teada enne IMODIUM'i võtmist
3. Kuidas IMODIUM'i võtta
4. Võimalikud kõrvaltoimed
5. Kuidas IMODIUM'i säilitada
6. Pakendi sisu ja muu teave

1. Mis ravim on IMODIUM ja milleks seda kasutatakse

IMODIUM on ravim kõhulahtisuse vastu.

Kõhulahtisuse korral muudab IMODIUM väljaheite tahkemaks ja roojamise harvemaks.

IMODIUM'it kasutatakse ägeda mittespetsiifilise kõhulahtisuse korral täiskasvanutel ja üle 12-aastastel lastel. Kroonilise kõhulahtisuse korral on vajalik kindlasti pöörduda arsti poole, kes selgitab välja kõhulahtisuse põhjuse ja määrab teile sobiva ravi.

2. Mida on vaja teada enne IMODIUM'i võtmist

IMODIUM'i ei tohi anda ilma arstiga konsulteerimata ja arsti järelevalveta **alla 12-aastastele lastele.**

Ärge võtke IMODIUM'i:

- kui väljaheites on veri või kui teil on kõrge palavik (äge düsenteeria);
- kui teil esineb soolepõletik (näiteks haavandiline koliit või antibiootikumide kasutamise tagajärjel tekkinud pseudomembranoosne koliit);
- kui teil on bakteritest tingitud soolepõletik;
- kui teil esineb kõhukinnisus või kõhupuhitus;
- kui olete loperamiidvesinikkloriidi või selle ravimi mis tahes koostisosa(de) (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Eriline ettevaatlikkus ravimiga IMODIUM on vajalik:

- Kuigi IMODIUM toimib kõhulahtisuse vastu, ei ravi ta selle põhjust. Võimalusel tuleb ravida ka kõhulahtisuse põhjust.
- Kõhulahtisuse korral kaotate te palju vedelikku. Kaotatud vedeliku asendamiseks tuleb teil palju juua. Apteegist saate osta spetsiaalset pulbrit, mis sisaldab suhkrut ja soolasid. Kui lisate seda veele, asendab see ka kõhulahtisuse ajal kaotatud soolad. See lahus on eriti sobiv lastele.
- Ägeda kõhulahtisuse korral taandub kõhulahtisus IMODIUM'i toimel tavaliselt 48 tunni jooksul. Kui toime puudub, siis lõpetage ravimi tarvitamine ja pöörduge arsti poole.

* Selgitus: 6 tk pakendis - käsimüügiravim; 20 tk pakendis - retseptiravim

- AIDS'i põdevad patsiendid, keda on kõhulahtisuse tõttu ravitud IMODIUM'iga, peavad kõhupuhituse tekkimisel IMODIUM'i kasutamise koheselt lõpetama. AIDS'i patsientidel, kelle viirusest või bakteritest põhjustatud kõhulahtisust raviti loperamiidvesinikkloriidiga on teatatud kääsoole toksiline laienemuse üksikutest juhtudest.

Täiendavad hoiatused ja ettevaatusabinõud soole ärritussündroomiga patsientidele

- teil esineb raske kõhukinnisus;
- teil esineb kaalulangus;
- teie sümptomid süvenevad, lisanduvad, muutuvad või kui kõhulahtisuse episoodid kestavad kauem kui kaks nädalat.

Kui mõni ülalloetletu kehtib teie kohta, siis pidage enne IMODIUM'i kasutamist nõu oma arstiga.

On kirjeldatud loperamiidi (IMODIUM'i toimeaine) kuritarvitamist ja väärkasutamist. Ärge kasutage seda ravimit millekski muuks kui ette nähtud (vt lõik 1) ning ärge mitte kunagi võtke rohkem kui on soovitatud annus (vt lõik 3).

Lapsed

IMODIUM'i ei kasutata arstiga konsulteerimata ja arsti järelevalveta alla 12-aastastel lastel.

Rasedus

Kui te olete rase või kahtlustate rasedust, siis informeerige sellest oma arsti, kes otsustab, kas te tohite IMODIUM'i kasutada või mitte.

Imetamine

IMODIUM'i ei soovitata rinnaga toitmise ajal kasutada, kuna see eritub väikestes kogustes rinnapiima.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Ettevaatlik peab olema juhul, kui te tunnete väsimust, pearinglust või unisust.

Kasutamine koos teiste ravimitega

Palun informeerige oma arsti sellest, kui te võtate ravimeid, mis aeglustavad seedetegevust (näiteks antikolinergilised ravimid), kuna nende ravimite toimel võib IMODIUM'i toime tugevneda. IMODIUM'i toimet võivad tugevdada ka kinidiin ja ritonaviir. Kolestüramiin võib IMODIUM'i toimet vähendada.

Maksafunktsiooni häire

Palun informeerige oma arsti sellest, kui Teil esineb mõni maksahaigus. Te võite IMODIUM-ravi ajal vajada hoolikat arstlikku järelevalvet, sest maksakahjustuse korral võivad kõrvaltoimed tekkida sagedamini.

IMODIUM sisaldab abiainena laktoosi. Kui arst on teile öelnud, et te ei talu teatud suhkruid, peate te enne ravimi kasutamist konsulteerima arstiga.

3. Kuidas IMODIUM'i võtta

Võtke seda ravimit alati täpselt nii, nagu on kirjeldatud selles infolehes või nagu arst või apteeker on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

IMODIUM on saadaval **kapslitena**, mida manustatakse suu kaudu.

IMODIUM'i võib võtta igal kellaajal.

Kapslid võetakse koos veega.

Äge mittespetsiifiline kõhulahtisus

* Selgitus: 6 tk pakendis - käsimüügiravim; 20 tk pakendis - retseptiravim

Täiskasvanud ja üle 12-aastased lapsed

- Ägeda kõhulahtisuse korral võtke alguses korraga sisse 2 kapslit (4 mg), järgnevalt 1 kapsel (2 mg) pärast iga vedela väljaheitega roojamist, kuid mitte varem kui 2...3 tundi pärast esialgset annust. Kui väljaheide muutub tahkeks või tekib kõhukinnisus või kui kõht ei ole viimase 24 tunni jooksul läbi käinud, siis ärge rohkem kapsleid võtke.
Tähelepanu! 24 tunni jooksul ei tohi võtta üle 6 kapsli (12 mg).

Alla 12-aastased lapsed

Alla 12-aastastele lastele ei tohi IMODIUM'i anda ilma arsti ettekirjutuseta ja meditsiinilise järelevalveta.

Kõhulahtisuse korral kaotate te palju vedelikku. Kaotatud vedeliku asendamiseks tuleb teil palju juua.

Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Lõpetage IMODIUM-ravi, kui väljaheide muutub normaalseks või kui kõht ei ole 12 tunni jooksul läbi käinud.

Kui te võtate IMODIUM'i rohkem kui ette nähtud

Kui te olete manustanud liiga palju IMODIUM'i, siis võtke viivitamatult ühendust arstiga või pöörduge haiglasse, eriti kui tekivad järgmised sümptomid: kiirenenud südame löögisagedus, ebaregulaarsed südamelöögid, muutused südamelöökides (nendel sümptomitel võivad olla tõsised, eluohtlikud tagajärjed), lihasjäikus, koordinatsioonihäired, unisus, urineerimisraskused või hingamise nõrgenemine.

Lapsed on IMODIUM'i üleannustamise suhtes tundlikumad kui täiskasvanud. Kui laps võtab sisse liiga palju ravimit või kui tal tekivad eespool nimetatud sümptomid, siis võtke viivitamatult ühendust arstiga.

Informatsioon arstile ravimi üleannustamise korral

- Alustada EKG-monitooringut.
- Süstida naloksooni.
- Vajadusel korrata naloksooni manustamist 1...3 tunni pärast.
- Vajalik on patsiendi jälgimine vähemalt 48 tunni vältel.

4. Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

- IMODIUM on üldiselt hästi talutav ja selle ettekirjutustekohasel kasutamisel esineb kõrvaltoimeid harva.
- Tekkida võib kõhukinnisus ja kõhupuhitus. Sellisel juhul tuleb IMODIUM ära jätta. Kui need kõrvaltoimed on rasked, pöörduge arsti poole.
- Väga harva on tekkinud ülitundlikkus IMODIUM'i suhtes. Ülitundlikkusnähtudeks on näiteks nahalööve, sügelus, õhupuudus ja näo turse. Nende nähtude ilmnemisel pöörduge arsti poole.
- Väga harva on tekkinud kõhuvalu, iileus, iiveldus, oksendamine, laienenud ja lõtv käärsool (sh kääsoole toksiline laienemus); kõhugaasid ja seedeäired, unisus, teadvuskadu, teadvushäired, peeringlus.
- Üksikjuhtudel on teatatud tõsistest nahareaktsioonidest, mille tekkimisel tuleb kohe arsti poole pöörduda. Üksikjuhtudel on tekkinud kusepeetus.

Mõned teatud kõrvaltoimed võivad olla kaasnevad sümptomid kõhulahtisusele (kõhuvalu/ebamugavustunde kõhus, iiveldus, oksendamine, suukuivus, väsimus, unisus, peeringlus, kõhukinnisus ja kõhugaasid). Neid sümptomeid on väga raske eristada ravimi kõrvaltoimetest.

Kõrvaltoimetest teavitamine

* Selgitus: 6 tk pakendis - käsimüügiravim; 20 tk pakendis - retseptiravim

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

5. Kuidas IMODIUM'i säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Hoida temperatuuril kuni 30 °C.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale. Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

6. Pakendi sisu ja muu teave

Mida IMODIUM sisaldab

Toimeaine on loperamiidvesinikkloriid.

Abiaineid on:

Kapsli sisu: laktoos monohüdraat, maisitärklis, talk, magneesiumstearaat.

Kapsli kest: titaandioksiid (E171), kollane raudoksiid (E172), indigotiin (E132), želatiin, must raudoksiid (E172), erütrosiin (E127).

Kuidas IMODIUM välja näeb ja pakendi sisu

IMODIUM on saadaval kapslitena; valge pulbriga täidetud kapslikeha (suurus 4) on tumehall ja kapslikaas roheline. Pakendis on 6 kapslit.

Müügiloo hoidja:

McNeil Products Limited
c/o Johnson & Johnson Limited
Foundation Park, Roxborough Way
Maidenhead, Berkshire, SL6 3UG
Ühendkuningriik

Tootja:

Janssen-Cilag
Domaine de Maigremont
27100 Val de Reuil
Prantsusmaa

Infoleht on viimati uuendatud Jaanuaris 2017

Pakendi infoleht: teave patsiendile (retseptiravim*)

IMODIUM, 2 mg kõvakapslid
Loperamiidvesinikkloriid

Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

- Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
- Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti või apteekriga.
- Ravim on välja kirjutatud üksnes teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik, isegi kui haigusnähud on sarnased.
- Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.

Infolehe sisukord

1. Mis ravim on IMODIUM ja milleks seda kasutatakse
2. Mida on vaja teada enne IMODIUM'i võtmist
3. Kuidas IMODIUM'i võtta
4. Võimalikud kõrvaltoimed
5. Kuidas IMODIUM'i säilitada
6. Pakendi sisu ja muu teave

1. Mis ravim on IMODIUM ja milleks seda kasutatakse

IMODIUM on ravim kõhulahtisuse vastu.

Kõhulahtisuse korral muudab IMODIUM väljaheite tahkemaks ja roojamise harvemaks.

IMODIUM'it kasutatakse ägeda mittespetsiifilise kõhulahtisuse korral täiskasvanutel ja üle 8-aastastel lastel. Kroonilise kõhulahtisuse korral on vajalik kindlasti pöörduda arsti poole, kes selgitab välja kõhulahtisuse põhjuse ja määrab Teile sobiva ravi.

2. Mida on vaja teada enne IMODIUM'i võtmist

IMODIUM'i ei tohi anda **alla 8-aastastele lastele**.

Ärge võtke IMODIUM'i:

- kui väljaheites on veri või kui Teil on kõrge palavik (äge düsenteeria);
- kui Teil esineb soolepõletik (näiteks haavandiline koliit või antibiootikumide kasutamise tagajärjel tekkinud pseudomembranoosne koliit);
- kui Teil on bakteritest tingitud soolepõletik;
- kui Teil esineb kõhukinnisus või kõhupuhitus;
- kui olete loperamiidvesinikkloriidi või selle ravimi mis tahes koostisosa(de) (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Eriline ettevaatlikkus ravimiga IMODIUM on vajalik:

- Kuigi IMODIUM toimib kõhulahtisuse vastu, ei ravi ta selle põhjust. Võimalusel tuleb ravida ka kõhulahtisuse põhjust.
- Kõhulahtisuse korral kaotate te palju vedelikku. Kaotatud vedeliku asendamiseks tuleb Teil palju juua. Apteegist saate osta spetsiaalset pulbrit, mis sisaldab suhkrut ja soolasid. Kui lisate seda veele, asendab see ka kõhulahtisuse ajal kaotatud soolad. See lahus on eriti sobiv lastele.
- Ägeda kõhulahtisuse korral taandub kõhulahtisus IMODIUM'i toimel tavaliselt 48 tunni jooksul. Kui toime puudub, siis lõpetage ravimi tarvitamine ja pöörduge arsti poole.
- AIDS'i põdevad patsiendid, keda on kõhulahtisuse tõttu ravitud IMODIUM'iga, peavad kõhupuhituse tekkimisel IMODIUM'i kasutamise koheselt lõpetama. AIDS'i patsientidel, kelle

* Selgitus: 6 tk pakendis - käsimüügiravim; 20 tk pakendis - retseptiravim

viirusest või bakteritest põhjustatud kõhulahtisust raviti loperamiidvesinikkloriidiga on teatatud kääsoole toksilise laienemuse üksikutest juhtudest.

Täiendavad hoiatused ja ettevaatusabinõud soole ärritussündroomiga patsientidele

- teil esineb raske kõhukinnisus;
- teil esineb kaalulangus;
- teie sümptomid süvenevad, lisanduvad, muutuvad või kui kõhulahtisuse episoodid kestavad kauem kui kaks nädalat.

Kui mõni ülalloetletu kehtib teie kohta, siis pidage enne IMODIUM'i kasutamist nõu oma arstiga.

On kirjeldatud loperamiidi (IMODIUM'i toimeaine) kuritarvitamist ja väärkasutamist. Ärge kasutage seda ravimit millekski muuks kui ette nähtud (vt lõik 1) ning ärge mitte kunagi võtke rohkem kui on soovitatud annus (vt lõik 3).

Lapsed

IMODIUM'i ei kasutata alla 8-aastastel lastel.

Rasedus

Kui te olete rase või kahtlustate rasedust, siis informeerige sellest oma arsti, kes otsustab, kas te tohite IMODIUM'i kasutada või mitte.

Imetamine

IMODIUM'i ei soovitata rinnaga toitmise ajal kasutada, kuna see eritub väikestes kogustes rinnapiima.

Auto juhtimine ja masinatega töötamine

Ettevaatlik peab olema juhul, kui te tunnete väsimust, pearinglust või unisust.

Kasutamine koos teiste ravimitega

Informeerige oma arsti sellest, kui te võtate ravimeid, mis aeglustavad seedetegevust (näiteks antikolinergilised ravimid), kuna nende ravimite toimel võib IMODIUM'i toime tugevneda. IMODIUM'i toimet võivad tugevdada ka kinidiin ja ritonaviir. Kolestüramiin võib IMODIUM'i toimet vähendada.

Maksafunktsiooni häire

Informeerige oma arsti sellest, kui Teil esineb mõni maksahaigus; te võite IMODIUM-ravi ajal vajada hoolikat arstlikku järelevalvet, sest maksakahjustuse korral võivad kõrvaltoimed tekkida sagedamini.

IMODIUM sisaldab abiainaena laktoosi. Kui arst on teile öelnud, et te ei talu teatud suhkruid, peate te enne ravimi kasutamist konsulteerima arstiga.

3. Kuidas IMODIUM'i võtta

Võtke seda ravimit alati täpselt nii, nagu on kirjeldatud selles infolehes või nagu arst või apteeker on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

IMODIUM on saadaval **kapslitena**, mida manustatakse suu kaudu.

IMODIUM'i võib võtta igal kellaajal.

Kapslid võetakse koos veega.

Äge mittespetsiifiline kõhulahtisus

Täiskasvanud ja üle 12-aastased lapsed

- Ägeda kõhulahtisuse korral võtke alguses korraga sisse 2 kapslit (4 mg), järgnevalt 1 kapsel (2 mg) pärast iga vedela väljaheitega roojamist, kuid mitte varem kui 2...3 tundi pärast esialgset annust. Kui väljaheide muutub tahkeks või tekib kõhukinnisus või kui kõht ei ole viimase 24 tunni jooksul läbi käinud, siis ärge rohkem kapsleid võtke.

* Selgitus: 6 tk pakendis - käsimüügiravim; 20 tk pakendis - retseptiravim

Tähelepanu! 24 tunni jooksul ei tohi võtta üle 6 kapsli (12 mg)!

Alla 8-aastased lapsed

Alla 8-aastastel lastel kõhulahtisuse raviks IMODIUM'i ei kasutata.

Tähelepanu! Ärge kunagi ületage maksimaalset ööpäevast annust.

Kõhulahtisuse korral kaotate te palju vedelikku. Kaotatud vedeliku asendamiseks tuleb teil palju juua.

Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Lõpetage IMODIUM-ravi, kui väljaheide muutub normaalseks või kui kõht ei ole 12 tunni jooksul läbi käinud.

Kui te võtate IMODIUM'i rohkem kui ette nähtud

Kui te olete manustanud liiga palju IMODIUM'i, siis võtke viivitamatult ühendust arstiga või pöörduge haiglasse, eriti kui tekivad järgmised sümptomid: kiirenenud südamelöögisagedus, ebaregulaarsed südamelöögid, muutused südamelöökides (nendel sümptomitel võivad olla tõsised, eluohtlikud tagajärjed), lihasjäikus, koordinatsioonihäired, unisus, urineerimisraskused või hingamise nõrgenemine.

Lapsed on IMODIUM'i üleannustamise suhtes tundlikumad kui täiskasvanud. Kui laps võtab sisse liiga palju ravimit või kui tal tekivad eespool nimetatud sümptomid, siis võtke viivitamatult ühendust arstiga.

Informatsioon arstile ravimi üleannustamise korral

- Alustada EKG-monitooringut.
- Süstida naloksooni.
- Vajadusel korrata naloksooni manustamist 1...3 tunni pärast.
- Vajalik on patsiendi jälgimine vähemalt 48 tunni vältel.

4. Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

- IMODIUM on üldiselt hästi talutav ja selle ettekirjutustekohasel kasutamisel esineb kõrvaltoimeid harva.
- Tekkida võib kõhukinnisus ja kõhupuhitus. Sellisel juhul tuleb IMODIUM ära jätta. Kui need kõrvaltoimed on rasked, pöörduge arsti poole.
- Väga harva on tekkinud ülitundlikkus IMODIUM'i suhtes. Ülitundlikkusnähtudeks on näiteks nahalööve, sügelus, õhupuudus ja näo turse. Nende nähtude ilmnemisel pöörduge arsti poole.
- Väga harva on tekkinud kõhuvalu, iileus, iiveldus, oksendamine, laienenud ja lõtv käärsool (sh kääsoole toksiline laienemus); kõhugaasid ja seedeäired, unisus, teadvuskadu, teadvushäired, pearinglus.
- Üksikjuhtudel on teatatud tõsistest nahareaktsioonidest, mille tekkimisel tuleb kohe arsti poole pöörduda. Üksikjuhtudel on tekkinud kusepeetus.

Mõned teatud kõrvaltoimed võivad olla kaasnevad sümptomid kõhulahtisusele (kõhuvalu/ebamugavustunne kõhus, iiveldus, oksendamine, suukuivus, väsimus, unisus, pearinglus, kõhukinnisus ja kõhugaasid). Neid sümptomeid on väga raske eristada ravimi kõrvaltoimetest.

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

5. Kuidas IMODIUM'i säilitada

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

* Selgitus: 6 tk pakendis - käsimüügiravim; 20 tk pakendis - retseptiravim

Hoida temperatuuril kuni 30 °C.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale. Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

6. Pakendi sisu ja muu teave

Mida IMODIUM sisaldab

Toimeaine on loperamiidvesinikkloriid.

Abiaineid on:

Kapsli sisu: laktoos monohüdraat, maisitärklis, talk, magneesiumstearaat.

Kapsli kest: titaandioksiid (E171), kollane raudoksiid (E172), indigotiin (E132), želatiin, must raudoksiid (E172), erütrosiin (E127).

Kuidas IMODIUM välja näeb ja pakendi sisu

IMODIUM'i on saadaval kapslitena; valge pulbriga täidetud kapslikeha (suurus 4) on tumehall ja kapslikaas roheline. Pakendis on 20 kapslit.

Müügiloa hoidja:

McNeil Products Limited
c/o Johnson & Johnson Limited
Foundation Park, Roxborough Way
Maidenhead, Berkshire, SL6 3UG
Ühendkuningriik

Tootja:

Janssen-Cilag
Domaine de Maigremont
27100 Val de Reuil
Prantsusmaa

Infoleht on viimati uuendatud jaanuaris 2017