

PAKENDI INFOLEHT: teave kasutajale

Sodium Chloride B. Braun 0,9%, süstelahus Naatriumkloriid

Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

Kasutage seda ravimit alati täpselt nii, nagu on kirjeldatud selles infolehes või nagu arst või apteeker on teile selgitanud.

- Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
- Lisateabe saamiseks pidage nõu oma apteekriga..
- Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.
- Kui te ei tunne end paremini või tunnete end halvemini, peate võtma ühendust arstiga.

Infolehe sisukord:

1. Mis ravim on Sodium Chloride B. Braun 0,9% ja milleks seda kasutatakse
2. Mida on vaja teada enne Sodium Chloride B. Braun 0,9% kasutamist
3. Kuidas Sodium Chloride B. Braun 0,9% kasutada
4. Võimalikud kõrvaltoimed
5. Kuidas Sodium Chloride B. Braun 0,9% säilitada
6. Pakendi sisu ja muu teave

1. Mis ravim on Sodium Chloride B. Braun 0,9 % ja milleks seda kasutatakse

See ravim on naatriumkloriid, mida manustatakse süstina.

Ravim sisaldab naatriumkloriidi sellises kontsentratsioonis, mis on sarnane teie organismi enda sooladesisaldusele.

Seda kasutatakse süstitavate ravimite lahustamiseks või lahjendamiseks.

2. Mida on vaja teada enne Sodium Chloride B. Braun 0,9% kasutamist

Ärge kasutage Sodium Chloride B.Braun 0,9%

Ei ole teada seisundeid, mis rangelt välistaksid Sodium Chloride B.Braun 0,9% kasutamise.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Eriline ettevaatus on vajalik ravimiga Sodium Chloride B. Braun 0,9%

- kui teie vere naatriumitase on väga kõrge (hüpernatreemia)
- kui teie vere kloriiditase on väga kõrge (hüperkloreemia)

Muud ravimid ja Sodium Chloride B.Braun 0,9%

Palun informeerige oma arsti või apteekrit, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud mingeid muid ravimeid, kaasa arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid.

Rasedus ja imetamine

Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arsti või apteekriga

Rasedus

Riskid rasedusaegsel kasutamisel ei ole teada.

Imetamine

Riskid imetamisaegsel kasutamisel ei ole teada.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Sodium Chloride B.Braun 0,9% ei oma mõju autojuhtimisele ja masinate käsitsemisele.

3. Kuidas Sodium Chloride B. Braun 0,9% kasutada

Seda ravimit kasutatakse süstide ettevalmistamiseks (süstla kaudu manustatavad ravimid). Seda manustatakse teile veeni (veenisisene kasutamine) või naha alla (nahaalne kasutamine).

Annustamine

Kasutatav kogus sõltub lahustatava või lahjendatava ravimi kohta antud juhistest.

Kui te saate Sodium Chloride B. Braun 0,9% rohkem kui ette nähtud

Kui te olete saanud liiga palju lahust, võib teil tekkida vedeliku kuhjumine organismi, naatriumi, kloriidide ja happeliste ainete taseme ülemäärane suurenemine teie veres (veri muutub happeliseks).

Sellisel juhul peatatakse infusioon koheselt. Lisaks antakse teile veetablette, et suurendada uriinieritust. Teie vere elektrolüütide taset jälgitakse pidevalt. Teie arst otsustab ravimite edasise kasutamise või meetmete üle, et normaliseerida teie elektrolüütide taset, vee ja happeluse tasakaalu.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

4. Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

5. Kuidas Sodium Chloride 0,9% säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud ampullil või välispakendil. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Ärge kasutage ravimit, kui te märkate, et lahus on hägune või kui te märkate lahuses osakesi või kui mahuti lekib.

Pärast kasutusvalmis segu valmistamist:

Mikrobioloogilisest vaatepunktist lähtudes, tuleb ravim kohe kasutada. Kui ravimit ei kasutata kohe, vastutab kasutusaegse aja ja kasutuseelsete säilitustingimuste eest kasutaja ning tavatingimustes ei toiks see olla pikem kui 24 tundi hoituna temperatuuril 2...8 °C.

6. Pakendi sisu ja muu teave

Mida Sodium Chloride B.Braun 0,9% sisaldab:

- Toimeaine on naatriumkloriid.
 - Üks ml lahust sisaldab 9,0 mg naatriumkloriidi.
- Abiaine on süstevesi.

Kuidas Sodium Chloride B.Braun 0,9% välja näeb ja pakendi sisu

Sodium Chloride B. Braun 0,9% on selge, värvitu naatriumkloriidi vesilahus.

Ravim on saadaval:

- Kummikorgiga klaasviaalides, mis sisaldavad 50 ml või 100 ml lahust. 20 viaaliga pakendid.
- Polüetüleenampullides, mis sisaldavad 10 ml või 20 ml lahust. 20 ampulliga pakendid.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja ja tootja

B.Braun Melsungen AG
D-34212 Melsungen
Saksamaa

Postiaadress:

B. Braun Melsungen AG
34209 Melsungen, Saksamaa

Tel.: +49/5661/71-0

Fax: +49/5661/71 4567

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.

B.Braun Medical OÜ
Kadaka tee 70b
12618, Tallinn
Tel.:(0) 677 12 00

Infoleht on viimati uuendatud mais 2015