

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Stoptussin Fyto, siirup

Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

Võtke seda ravimit alati täpselt nii, nagu on kirjeldatud selles infolehes või nagu arst või apteeker on teile selgitanud.

- Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
- Lisateabesaamiseks pidage nõu oma apteekriga.
- Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.
- Kui pärast 3 päeva (lapsed) või 5 päeva (täiskasvanud) möödumist ravi alustamisest te ei tunne end paremini või tunnete end halvemini, peate võtma ühendust arstiga.

Infolehe sisukord

1. Mis ravim on Stoptussin Fyto ja milleks seda kasutatakse
2. Mida on vaja teada enne Stoptussin Fyto võtmist
3. Kuidas Stoptussin Fyto't võtta
4. Võimalikud kõrvaltoimed
5. Kuidas Stoptussin Fyto't säilitada
6. Pakendi sisu ja muu teave

1. Mis ravim on Stoptussin Fyto ja milleks seda kasutatakse

Kui pärast 3 päeva (lapsed) või 5 päeva (täiskasvanud) möödumist ravi alustamisest te ei tunne end paremini või tunnete end halvemini, peate võtma ühendust arstiga.

Siirup sisaldab aed-liivatee, nõmm-liivatee ning, teelehe vedelekstrakti ja mett. Ravimit kasutatakse abistava ravimina ägedate ja krooniliste hingamisteede põletike ravis röga lahustamiseks.

Ilma arstiga konsulteerimata võivad Stoptussin Fyto't võtta üle 4-aastased lapsed, noorukid ja täiskasvanud.

1...4-aastased lapsed võivad seda ravimit võtta ainult arsti soovitusel.

Selle traditsioonilise taimse ravimi kasutamine põhineb üksnes pika-ajalisel kasutamiskogemusel.

2. Mida on vaja teada enne Stoptussin Fyto võtmist

Ärge võtke Stoptussin Fyto't

- kui olete aed-liivatee, nõmm-liivatee, teelehe või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline.
- kui te olete teiste huulõieliste (Lamiaceae) sugukonda kuuluvate taimede suhtes allergiline.
- ravimit ei tohi anda alla 1-aastastele lastele

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

1...4-aastased lapsed võivad seda ravimit võtta ainult arsti soovitusel.

Eriline ettevaatus on vajalik:

- fruktoositalumatuse, glükoosi-galaktoosi malabsorptsiooni või sahharoosi-isomaltasi puudulikkuse korral. Enne ravimi kasutamist pidage nõu oma arstiga.
- kui tekib hingeldus, palavik või mädane röga või kui köha püsib kauem kui 1 nädal. Võtke ühendust oma arstiga.
- kui teil on neeru- või maksahäireid, pidage nõu oma arsti või apteekriga.
- kui teil esineb ülihappesust, gastriiti või seedetraktihaavandeid ei tohi te seda ravimit kasutada.

Lapsed ja noorukid

Köha ravi 1...4-aastastel lastel peab toimuma ainult arsti järelevalve all.

Muud ravimid ja Stoptussin Fyto

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud või kavatsete kasutada mis tahes muid ravimeid.

Rasedus, imetamine ja viljakus

Andmed toime kohta rasedatel patsientidel puuduvad. Ei ole teada, kas Stoptussin Fyto siirupi koostisosad erituvad rinnapiima.

Kasutamine raseduse ja rinnaga toitmise ajal ei ole soovitatav.

Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arsti või apteekriga.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Puuduvad andmed Stoptussin Fyto võimaliku toime kohta patsiendi võimele juhtida autot või käsitseda masinaid. Siiski, arvestades alkoholisisaldust, võib Stoptussin Fyto soovitatud annuse (15 ml) manustamise järgselt vaid kuni 5 minutit mõjutada neid tegevusi negatiivselt.

Stoptussin Fyto sisaldab sahharoosi ja etanooli

Kui arst on teile öelnud, et te ei talu teatud suhkruid, peate te enne ravimi kasutamist konsulteerima arstiga.

Ravim sisaldab 3,4 mahu% etanooli (alkoholi). Kui seda võetakse vastavalt soovitudele, sisaldab 5 ml siirupit kuni 0,14 g etanooli, mis vastab 3,4 ml õllele (5 mahu% etanooli) ja 1,4 ml veinile (12 mahu% etanooli), 15 ml siirupit sisaldab kuni 0,41 g etanooli, mis vastab 10,2 ml õllele (5 mahu% etanooli) ja 4,3 ml veinile (12 mahu% etanooli). Kahjulik alkoholismi probleemidega isikutele. Sellega tuleb arvestada rasedate, rinnaga toitvate naiste, laste ja kõrge riskigrupiga patsientide puhul, nt maksahaigused või epilepsia.

3. Kuidas Stoptussin Fyto't võtta

Võtke seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst või apteeker on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Soovitatav annus on

Lapsed vanuses 1...4 eluaastat: 2,5 ml...15 ml siirupit 3 korda ööpäevas, pärast sööki (eesmärgiga vältida isutust) ainult arsti järelevalve all.

Lapsed vanuses 4...12 eluaastat: 2,5 ml...15 ml siirupit 3 korda ööpäevas, pärast sööki (eesmärgiga vältida isutust).

Noorukid alates 12. eluaastast, täiskasvanud ja eakad: 15 ml maksimaalselt 4 korda ööpäevas.

Manustamiseks kasutatakse ravimiga kaasasolevat mõõtetopsi.

Kasutamise kestus:

Ärge kasutage Stoptussin Fyto't ilma arstiga konsulteerimata kauem kui 10 päeva. Kui pärast 3 päeva (lapsed) või 5 päeva (täiskasvanud) möödumist ravi alustamisest te ei tunne end paremini või tunnete end halvemini või kui tekib mõni ebatavaline reaktsioon, peate võtma ühendust arstiga.

Kui te võtate Stoptussin Fyto't rohkem kui ette nähtud

Kui te võite olla võtnud Stoptussin Fyto't rohkem kui ette nähtud, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Kui te unustate Stoptussin Fyto't võtta

Ärge võtke kahekordset annust, kui annus jäi eelmisel korral võtmata.

Kui te lõpetate Stoptussin Fyto võtmise

Ravi katkestamine ei põhjusta mingeid tagajärgi.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

4. Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Soovitatud annuste kasutamisel talutakse ravimit hästi.

Kui te siiski märkate mõnda kõrvaltoimet, informeerige sellest oma arsti või apteekrit.

Väga harvadel juhtudel on täheldatud ülitundlikkusreaktsioone (nt hingeldus, nahalööve, nõgestõbi, samuti näoturse, suu ja kõri turse, anafülaktiline šokk) või seedetrakti häireid (spasmid, iiveldus, oksendamine). Suurte annuste puhul, mis ületavad tugevalt soovitatud annust, võivad esineda iiveldus ja oksendamine.

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada

www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

5. Kuidas Stoptussin Fyto't säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Hoida temperatuuril kuni 25°C. Hoida originaalpakendis, valguse eest kaitstult.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud pakendil. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

6. Pakendi sisu ja muu teave

Mida Stoptussin Fyto sisaldab

- Toimeained on aed-liivatee vedelekstrakt, nõmm-liivatee vedelekstrakt ja teelehe vedelekstrakt.

1 ml siirupit sisaldab:

Thymus vulgaris L., herba või *Thymus zygis* L., herba (aed-liivatee) vedelekstrakti (1:1,11) 41,624 mg.

Ekstrakti solvent 25% (V/V) etanool.

Thymus serpyllum L., herba (nõmm-liivatee) vedelekstrakti (1:1,2) 41,630 mg.

Ekstrakti solvent 25% (V/V) etanool.

Plantago lanceolata L. s.l., herba (teelehe) vedelekstrakti (1:1,1) 41,666 mg.

Ekstrakti solvent 34% (V/V) etanool.

- Teised koostisosad on mesi, naatriumbensoaat (E211), sahharoos, glütserool 85%, etanool 96% ja puhastatud vesi.

Kuidas Stoptussin Fyto välja näeb ja pakendi sisu

Pruun aed-liivatee lõhnaga siirup 100 ml pruunist klaasist pudelis valge polüpropüleenkorgiga. Mõne aja jooksul võib tekkida kerge hägu, mis ei halvenda ravimi toimet. Pakendis on kaasas polüpropüleenist mõõtetops (graduateeritud 1,25 ml – 10 ml).

Pakendi suurus: 100 ml.

Müügiloa hoidja ja tootja

TEVA Czech Industries s.r.o.

Ostravská 29

747 70 Opava-Komárov
Tšehhi Vabariik

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole:

UAB Sicor Biotech Eesti filiaal
Hallivanamehe 4
11317 Tallinn
Eesti Vabariik
Telefon: +372 6610801

Infoleht on viimati uuendatud mais 2016.