

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Kamistad N, 20 mg + 185 mg/ g suuõõnegeel Lidokaiinvesinikkloriid ja kummeliõie ekstrakt

Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet. Kasutage seda ravimit alati täpselt nii, nagu on kirjeldatud selles infolehes või nagu arst või apteeker on teile selgitanud.

- Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
- Lisateabe saamiseks pidage nõu oma apteekriga.
- Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.
- Kui pärast 1 nädala möödumist te ei tunne end paremini või tunnete end halvemini, peate võtma ühendust arstiga.

Infolehe sisukord:

1. Mis ravim on Kamistad N ja milleks seda kasutatakse
2. Mida on vaja teada enne Kamistad N kasutamist
3. Kuidas ravimit Kamistad N kasutada
4. Võimalikud kõrvaltoimed
5. Kamistad N säilitamine
6. Pakendi sisu ja muu teave

1. Mis ravim on Kamistad N ja milleks seda kasutatakse

Kamistad N näidustus on

Igemete ja suuõõne limaskesta tuimestamine ning põletikunähtude leevendamine.

Juhul, kui põletiku sümptomid ei taandu nädalaga, tuleb pöörduda arsti poole.

2. Mida on vaja teada enne Kamistad N kasutamist

Ärge kasutage Kamistad N-i

- kui olete lidokaiini või teiste amiidirühma lokaalanesteetikumide, kummeli või teiste korvõieliste perekonda kuuluvate taimede, kaneeli, Peruu palsami või ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Enne Kamistad N-i kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Kamistad N ei tohi kokku puutuda silmade või avatud haavadega. Pärast Kamistad N manustamist tuleb käed hoolikalt puhtaks pesta.

Lapsed

Kuna läbi ei ole viidud piisavaid uuringuid, ei tohi Kamistad N-i kasutada alla 12-aastastel lastel.

Muud ravimid ja Kamistad N Teatage oma arstile või apteekrile, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud või kavatsete kasutada mis tahes muid ravimeid.

Infolehes ettenähtud annuste puhul koostoimeid ei ole teada.

Rasedus ja imetamine

Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arsti või apteekriga.

Kamistad N geeli kasutamise ohutust raseduse ja imetamise ajal ei ole tõestatud. Seega ei soovitata seda ravimit neil perioodidel kasutada.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Tänaseni ei ole toimet sõidukite ja masinate juhtimisele täheldatud.

Kamistad N sisaldab bensalkooniumkloriidi Bensalkooniumkloriid võib põhjustada naha ärritust.

3. Kuidas Kamistad N kasutada

Kasutage seda ravimit alati täpselt nii, nagu on kirjeldatud selles infolehes või nagu arst või apteeker on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Soovitatav annus on:

Täiskasvanud ja üle 12-aastased lapsed

Kolm korda ööpäevas umbes 0,5cm pikkune geeliriba.

Manustamisviis

Kanda geeliriba põletikulistele piirkondadele ja masseerida õrnalt sisse.

Kasutuse kestus Kui pärast 1 nädala möödumist te ei tunne end paremini või tunnete end halvemini, peate võtma ühendust arstiga.

Kui ravim toimib, siis põhimõtteliselt ei ole kasutuse kestus ajaliselt piiratud.

Kui unustate Kamistad N-i kasutada

Jätka ravi vastavalt juhistele. Ärge manustage rohkem geeli, kui tavaliselt.

Juhul, kui teil on selle ravimi kasutamise kohta küsimusi, pöörduge oma arsti või apteekri poole.

4. Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Aeg-ajalt (võib mõjutada kuni ühte inimest 100st)

Geeli manustamisele võib järgneda hetkeline kerge põletustunne.

Väga harv (võib mõjutada kuni ühte inimest 10 000st):

Kuna see ravim sisaldab lidokaiini, kaneeli ja kummelit, võivad esineda allergilised reaktsioonid (näit. kontaktallergia). Sellised reaktsioonid võivad ilmneda ka patsientidel, kes on ülitundlikud korvõieliste perekonda kuuluvate taimede (näiteks puju) ja Peruu palsami suhtes (ristallergia oht).

Juhul, kui ilmneb naha või limaskesta ülitundlikkus, tuleb Kamistad N geeli kasutamine lõpetada ning konsulteerida arstiga.

Kuna Kamistad N sisaldab bensalkooniumkloriidi, siis ravimi kasutamise ajal võib esineda naha ärritust.

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

5. Kuidas säilitada Kamistad N

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas!

Ärge kasutage seda ravimit geeli pärast pakendile ja tuubile märgitud kõlblikkusaja lõppu. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Hoida temperatuuril kuni 25°C. Pärast tuubi esmast avamist kasutada 12 kuu jooksul.
Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

6. Pakendi sisu ja muu teave

Mida Kamistad N sisaldab

- Toimeained on lidokaiinvesinikkloriid ja kummeliõie ekstrakt
1 g geeli sisaldab 20 mg lidokaiinvesinikkloriidi ja 185 mg kummeliõie ekstrakti (1:4-5).
Ekstrahent: 50% (V/V) etanool koos 1,37% trometamooliga (98% sipelghappe abil kohandatud pH-le 7.3).
- Teised abiained on bensalkooniumkloriidi lahus, etanool 96%, sipelghape, karbomeerid, naatriumsahhariin, trometamool, puhastatud vesi, Tseiloni kaneelipuu koore õli.

Kuidas Kamistad N välja näeb ja pakendi sisu

Kollakas-pruun geel.

Kamistad N geel on saadaval tuubis, mis sisaldab 10 g suuõõnegeeli.

Müügiloa hoidja ja tootja

STADA Arzneimittel AG
Stadastrasse 2-18
D 61118 Bad Vilbel
Saksamaa

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge, palun, müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.

Almar Sehver
Tartu mnt 16
10117 Tallinn
tel 6605910
almar@aaa.ee

Infoleht on viimati koostõlastatud: veebruaris 2014