

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Tonsilgon N, suukaudsed tilgad, lahus
Alteejuur, kummeliõisik, põldosjaürt, pähklipuuleht, raudrohuürt, tammekoor, võililleürt.

Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

Kasutage seda ravimit alati täpselt nii, nagu on kirjeldatud selles infolehes või nagu arst või apteeker on teile selgitanud.

- Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
- Lisateabe saamiseks pidage nõu apteekriga.
- Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.
- Kui pärast 7 päeva möödumist te ei tunne end paremini või tunnete end halvemini, peate võtma ühendust arstiga.

Infolehe sisukord

1. Mis ravim on Tonsilgon N ja milleks seda kasutatakse
2. Mida on vaja teada enne Tonsilgon N'i kasutamist
3. Kuidas Tonsilgon N'i kasutada
4. Võimalikud kõrvaltoimed
5. Kuidas Tonsilgon N'i säilitada
6. Pakendi sisu ja muu teave

1. Mis ravim on Tonsilgon N ja milleks seda kasutatakse

Taimne ravim mida kasutatakse sageli korduvate ja krooniliste neelupõletike, eriti tonsilliidi täiendavaks raviks.

2. Mida on vaja teada enne Tonsilgon N kasutamist

Ärge kasutage Tonsilgon N'i:

- kui olete toimeainete või selle ravimi mis tahes koostisosa (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline;
- teadaolev allergia korvõieliste sugukonda kuuluvate taimede nt puju, raudrohi, krüsanteem, karikakar suhtes, seoses nn ristreaktsioonidega kummeliõite suhtes;
- alla 1-aastastel lastel.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Kui sümptomid jäävad püsima kauemaks kui 7 päevaks või kui ilmneb hingeldus, palavik, mädane või verine rögaeritus, tuleb konsulteerida arstiga.

Muud ravimid ja Tonsilgon N

Koostoimeid ei ole uuritud. Tonsilgon N suukaudsete tilkade ja teiste ravimite kliinilisi koostoimeid ei ole registreeritud.

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud või kavatsete kasutada mis tahes muid ravimeid.

Rasedus, imetamine ja viljakus

Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arstiga.

Arvestada tuleb, et ravim sisaldab alkoholi.

Küllaldaste andmete puudumise tõttu tohib seda ravimpreparaati raseduse ja imetamise ajal kasutada ainult pärast kasu/riski hindamist arsti ettekirjutusel.

Fertiilsus

Toimet fertiilsusele ei ole uuritud.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Tonsilgon N ei mõjuta või mõjutab ebaoluliselt autojuhtimise ja masinate käsitsemise võimet.

Tonsilgon N tilgad sisaldavad 19% alkoholi, st 210 mg alkoholi 25 tilga kohta, mis vastab 5 ml õllele või 2 ml veinile. Ravim on ohtlik alkoholismi all kannatavatele patsientidele.

Ravimi alkoholisisaldusega peavad arvestama rasedad ja imetavad naised, lapsed kui nad kasutavad ravimit ettenähtust suuremates annustes ning kõrge-riski patsiendid nt kellel on maksahaigus või epilepsia. Nendel juhtudel tuleb enne ravimi kasutamist konsulteerida arstiga.

3. Kuidas Tonsilgon N'i kasutada

Kasutage seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst või apteeker on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Soovitavad annused

Ägedate sümptomite korral

Täiskasvanud ja noorukid alates 12. eluaastast: 25 tilka 5...6 korda päevas.

Lapsed vanuses 6...11 aastat: 15 tilka 5...6 korda päevas.

Lapsed vanuses 1...5 aastat: 10 tilka 5...6 korda päevas.

Pärast ägedate sümptomite taandumist

Täiskasvanud ja noorukid alates 12. eluaastast: 25 tilka 3 korda päevas.

Lapsed vanuses 6...11 aastat: 15 tilka 3 korda päevas.

Lapsed vanuses 1...5 aastat: 10 tilka 3 korda päevas.

Tonsilgon N tilku võetakse kolm korda päevas (hommikul, keskpäeval ja õhtul).

Enne allaneelamist on soovitatav lahust veidi aega suus hoida, vajadusel võtta tilku koos vedelikuga (nt klaasi veega).

Tonsilgon N'i peaks kasutama veel üks nädal pärast ägedate sümptomite taandumist.

Ravimit tohib kasutada pikaajaliselt.

Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu arsti või apteekriga.

Kui te võtate Tonsilgon N'i rohkem kui ette nähtud

Üleannustamise korral ei ole ägedaid mürgistusnähte täheldatud. Palun pöörduge arsti poole, kui te olete võtnud seda ravimit rohkem soovitatud annusest. Arst otsustab vajalike abinõude kasutusele võtmise.

Kui Te unustate Tonsilgon N'i võtta

Võtke ravimit nii kiiresti kui võimalik, kuid ärge ületage lubatud ööpäevast annust.

Kui te lõpetate Tonsilgon N'i võtmise

Tonsilgon N tilkade võtmise lõpetamine ei põhjusta probleeme.

4. Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki. Aeg-ajalt võivad esineda (ühel inimesel 100-st) seedetrakti häired (nt iiveldus, kõhuvalu). Teadmata sagedusega (sagedust ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel) võivad ilmneda allergilised reaktsioonid (nahalööve, urtikaaria nn nõgestõbi).

Esimeste ülitundlikkuse/allergilise reaktsiooni nähtude ilmnedes lõpetage Tonsilgon N'i võtmine.

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

5. Kuidas Tonsilgon N'i säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud pakendil. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale. Kõlblikkusaeg pärast esmast avamist on 6 kuud.

Hoida temperatuuril kuni 25°, originaalpakendis, niiskuse ja päikese eest kaitstult.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

6. Pakendi sisu ja muu teave

Mida Tonsilgon N sisaldab

1 g lahust sisaldab 0,29 g vedelekstrakti, mis sisaldab järgmisi taimi: alteejuur 4 mg, kummeliõisik 3 mg, põldosjauert 5 mg, pähklipuuleht 4 mg, raudrohuürt 4 mg, tammekoor 2 mg, võililleürt 4 mg.

Ekstrahent on 59% etanool.

Sisaldab 19% (mahuprotsenti) alkoholi.

1 ml (0,98g) lahust vastab 18 tilgale.

Kuidas Tonsilgon N välja näeb ja pakendi sisu

Tonsilgon N on selge kuni kergelt hägune, kollakaspruun vedelik kummeli lõhna ja maitsega.

Tonsilgon N suukaudsed tilgad on saadaval pruunist klaasist polüetüleenist tilguti ja polüetüleenist keeratava korgiga pudelis, mis on pakitud pappkarpi.

Saadaval on järgmised pakendi suurused: 50 ml, 100 ml ja 500 ml.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja ja tootja

Bionorica SE
Kerschensteinstrasse 11-15
92318 Neumark
Saksamaa

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole:

Miecys-Pharm OÜ

Vitamiini 4

Tartu

Eesti

Tel: + 373 7380676

Infoleht on viimati uuendatud augustis 2017