

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Traumeel S tabletid

Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

Võtke seda ravimit alati täpselt nii, nagu on kirjeldatud selles infolehes või nagu arst või apteeker on teile selgitanud.

- Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
- Lisateabe saamiseks pidage nõu oma apteekriga.
- Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga.
- Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.
- Kui te ei tunne end paremini või tunnete end halvemini, peate võtma ühendust arstiga.

Infolehe sisukord

1. Mis preparaat on Traumeel S ja milleks seda kasutatakse
2. Mida on vaja teada enne Traumeel S'i kasutamist.
3. Kuidas Traumeel S'i võtta
4. Võimalikud kõrvaltoimed
5. Kuidas Traumeel S'i säilitada
6. Pakendi sisu ja muu teave

1. MIS RAVIM ON TRAUMEEL S JA MILLEKS SEDA KASUTATAKSE

Traumeel S on homöopaatiline preparaat.

2. MIDA ON VAJA TEADA ENNE TRAUMEEL S'i KASUTAMIST

Ärge võtke Traumeel S'i, kui

- te olete allergiline või ülitundlik Traumeel S'i mis tahes koostisosade suhtes, mis on loetletud lõigus 6.
- te olete allergiline või ülitundlik arnika suhtes või teiste korvõieliste ja putkede suhtes.
- **Põhimõtteliselt Echinacea (päevakübar)** ei soovitata selliste süsteemsete haigustumiste nagu TBC, leukoosid, kollagenoosid, multiplex skleroos, AIDS, HIV-viirus infektsioon ja teiste autoimmuunhaiguste korral. Kilpnäärme haiguste puhul kasutada ainult arsti loal!

Muud ravimid ja Traumeel S

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud või kavatsete kasutada mis tahes muid ravimeid, kaasa arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid.

Rasedus, imetamine ja viljakus

Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arsti või apteekriga.

Negatiivset kogemust ei ole täheldatud.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Traumeel S'i kasutamine ei ohusta autojuhtimist või mehhanismide ja masinatega töötamist.

Traumeel S sisaldab laktoosi.

Kui arst on teile öelnud, et te ei talu teatud suhkruid, peate te enne Traumeel S'i kasutamist konsulteerima arstiga.

3. KUIDAS TRAUMEEL S'i KASUTADA

Võtke Traumeel S'i alati täpselt nii, arst on Teile selgitanud.
Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Soovitatav annus on:

Tavaline annus on 1 tablett 3 korda päevas keele alla kuni lahustumiseni.

Kui teil on tunne, et Traumeel S'i toime on liiga tugev või liiga nõrk, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Kui te võtate Traumeel S'i rohkem kui ette nähtud

Üleannustamisest ei ole teavitatud

Kui te unustate Traumeel S'i võtta

Ärge võtke kahekordset annust, kui ühekordne annus jäi eelmisel korral võtmata.

Kui te lõpetate Traumeel S'i võtmise

Kui teil on lisaküsimusi selle preparaadi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

4. VÕIMALIKUD KÕRVALTOIMED

Nagu kõik ravimid, võib ka Traumeel S põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Üksikutel juhtudel võivad tekkida naha lööve, hingeldus, iiveldus ja vererõhu langus.

Kui ravimi tarvitamise järgselt süljeeritus suureneb, on soovitatav ravimi tarvitamine lõpetada.

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

5. KUIDAS TRAUMEEL S'i HEEL SÄILITADA

See ravimpreparaat ei vaja säilitamisel eritingimusi.

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage Traumeel S'i pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

6. Pakendi sisu ja muu teave

Mida Traumeel S sisaldab

Toimeained: 1 tablett sisaldab:

| | | |
|--|----|-------|
| 1. <i>Arnica montana</i> | D2 | 15 mg |
| 2. <i>Calendula officinalis</i> | D2 | 15 mg |
| 3. <i>Hamamelis virginiana</i> | D2 | 15 mg |
| 4. <i>Achillea millefolium</i> | D3 | 15 mg |
| 5. <i>Atropa belladonna</i> | D4 | 75 mg |
| 6. <i>Aconitum napellus</i> | D3 | 30 mg |
| 7. <i>Mercurius solubilis Hahnemanni</i> | D8 | 30 mg |
| 8. <i>Hepar sulfuris</i> | D8 | 30 mg |
| 9. <i>Matricaria recutita</i> | D3 | 24 mg |
| 10. <i>Symphytum officinale</i> | D8 | 24 mg |
| 11. <i>Bellis perennis</i> | D2 | 6 mg |
| 12. <i>Echinacea</i> | D2 | 6 mg |
| 13. <i>Echinacea purpurea</i> | D2 | 6 mg |
| 14. <i>Hypericum perforatum</i> | D2 | 3 mg |

Abiained:

1. Laktoosmonohüdraat 6 mg;
2. Magneesiumstearaat 1,5 mg

Kuidas Traumeel S välja näeb ja pakendi sisu

Pappkarp, milles plastpurk 50 või 250 tabletiga.

Tableti kirjeldus: ümar, valge või kollakasvalge, siledapinnaline tablett kaldservaga, kohati on nähtavad oranžid laigud. Tabletid on 3,30 - 3,90 mm paksused, diameetriga 9,0 - 9,1 mm.

Müügiloa hoidja ja tootja

Biologische Heilmittel Heel GmbH
Dr.-Reckeweg-Str. 2-4
DE-76532 Baden-Baden
Saksamaa
Tel. +49 7221 501-00
Faks. +49 7221 501 485
E-mail: info@heel.de

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole:

Aconit AS
Võru tn 11
13612 Tallinn
Eesti
Tel. +372 - 6328 830
e-mail: info@aconit.ee

Infoleht on viimati uuendatud septembris 2014