

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Torasemide HEXAL 200 mg, tabletid Torasemiid

Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

- Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
- Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti või apteekriga.
- Ravim on välja kirjutatud üksnes teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik, isegi kui haigusnähud on sarnased.
- Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.

Infolehe sisukord

1. Mis ravim on Torasemide HEXAL 200 mg ja milleks seda kasutatakse
2. Mida on vaja teada enne Torasemide HEXAL 200 mg võtmist
3. Kuidas Torasemide HEXAL 200 mg võtta
4. Võimalikud kõrvaltoimed
5. Kuidas Torasemide HEXAL 200 mg säilitada
6. Pakendi sisu ja muu teave

1. Mis ravim on Torasemide HEXAL 200 mg ja milleks seda kasutatakse

Torasemide HEXAL 200 mg kasutatakse:

- raske kroonilise neerupuudulikkuse korral predialüüsi või dialüüsi saavatel patsientidel, eriti kui kaasnevad vedelikupeetusest tingitud tursed.

Torasemide HEXAL 200 mg on diureetikum, st ravim, mis suurendab uriinieritust.

2. Mida on vaja teada enne Torasemide HEXAL 200 mg võtmist

Ärge võtke Torasemide HEXAL 200 mg:

- kui olete torasemiidi või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline;
- kui olete allergiline teiste sarnaste ravimite suhtes, mida nimetatakse sulfonüüluureateks (nt kloorpropamiid, glibenklamiid) ja mida kasutatakse kõrge veresuhkru ravimiseks;
- kui teil on neerupuudulikkus, millega kaasneb ebapiisav uriinieritus;
- kui teil on raske maksakahjustus, millega kaasneb teadvuse kadu;
- kui teil on madal vererõhk: naistel madalam kui 100/60 mm Hg või meestel madalam kui 110/60 mm Hg;
- kui teie veremaht on vähenenud;
- kui teie vere kaaliumi- või naatriumisisaldus on vähenenud;
- kui teil on rasked uriinivoolu häired, mis on tingitud näiteks eesnäärme suurenemisest;
- kui teil on normaalne või ainult mõõdukalt halvenenud neerufunktsioon;
- kui te toidate last rinnaga.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Enne Torasemide HEXAL 200 mg kasutamist pidage nõu oma arstiga:

- kui teil on podagra;
- kui teil on ebakorrapärane südamerütm;
- kui teil on ebatavalised muutused vere happesuse tasakaalus;
- kui teil esineb ebatavaline verepilt;
- kui teil on neere kahjustavatest ainetest tingitud nõrgenenud neerutalitlus;
- kui teie kreatiniini kliirens on 20...30 ml/min ja/või teie vere kreatiniinisaldus on 3,5...6 mg/dl;

- kui te võtate ravimeid, mida nimetatakse „aminoglükosiidideks“ või tsefalosporiini (kasutatakse infektsioonide raviks) või liitiumi (kasutatakse depressiooni raviks) vt „Muud ravimid ja Torasemide HEXAL 200 mg“.

Kui te võtate Torasemide HEXAL 200 mg pidevalt, kontrollib teie arst regulaarselt verepilti, eriti kui te kasutate ka muid ravimeid.

Lapsed

Torasemide HEXAL 200 mg ei ole soovitatav alla 12-aasta vanustele lastele.

Hoiatus positiivse dopingutulemuse eest

Torasemide HEXAL 200 mg kasutamine võib anda positiivse tulemuse dopingukontrollis. Ei saa ette ennustada, kuidas mõjub tervisele, kui te kasutate Torasemide HEXAL 200 mg dopinguinena, samuti ei saa välistada tõsiseid terviseriske.

Muud ravimid ja Torasemide HEXAL 200 mg

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te võtate, olete hiljuti võtnud või kavatsete võtta mis tahes muid ravimeid.

Järgmised ravimid võivad mõjutada Torasemide HEXAL 200 mg või vastupidi:

- ravimid, mida kasutatakse kõrgvererõhu raviks, eriti ravimid, mida nimetatakse ACE-inhibiitoriteks (nt enalapriil, kaptopriil);
- ravimid, mida kasutatakse südame pumbafunktsiooni parandamiseks (nt digitoksiin, digoksiin või metüüldigoksiin);
- diabeediravimid;
- probenetsiid (podagra ravim);
- ravimid, mida kasutatakse põletiku ja valu korral (nt atsetüülsalitsüülhape või indometatsiin);
- sulfasalasiin, mesalasiin või olsalasiin (ravimid kroonilise põletikulise soolehaiguse raviks);
- antibiootikumid (nt tsefiksiim, tsefuroksiim, tsefakloor, tsefaleksiin, tsefadroksiil, tsefpodoksiim proksetiil, kanamütsiin, neomütsiin, gentamütsiin, amikatsiin või tobramütsiin);
- tsiisplatiin (vähiravim);
- liitium (depressiooniravim);
- teofülliin (astmaravim);
- mõned lihaskõõlastid, mille toimeaine nime lõpus on „-kuroonium“ või „-kuurium“;
- kõik kõhukinnisuse ravimid;
- ravimid, mis sisaldavad kortisooni (nt hüdrokortisoon, prednisoon või prednisoloon);
- kolestüramiin (vere lipiididesisalduse vähendamiseks kasutatav ravim);
- adrenaliin või noradrenaliin (vererõhku tõstvad ravimid).

Torasemide HEXAL 200 mg koos alkoholiga

Ärge võtke neid tablette koos alkoholiga.

Rasedus ja imetamine

Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arsti või apteekriga.

Imetamine

Torasemide HEXAL 200 mg kasutamine ei ole imetamise ajal soovitatav, sest see võib kahjustada last.

Rasedus

Võtke Torasemide HEXAL 200 mg raseduse ajal ainult sellisel juhul, kui teie arst ütleb, et see on äärmiselt vajalik.

Sel juhul tuleb kasutada nii väikest annust kui võimalik.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Torasemide HEXAL 200 mg võtmisel võib tekkida pearinglus, eriti ravi alguses, annuse suurendamisel, ravimvormi muutmisel, teise ravimi lisamisel või tarvitamisel koos alkoholiga. Kui teie tähelepanu on häiritud, ärge juhtige autot ega töötage masinatega.

3. Kuidas Torasemide HEXAL 200 mg võtta


Võtke seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Tavaline annus täiskasvanutele, noorukitele ja eakatele on:

- $\frac{1}{4}$ tabletti üks kord ööpäevas

Vajaduse korral võib teie arst annust järk-järgult suurendada kuni 1 tabletini ööpäevas.

Tableti poolitamine



Võtke tablett mõlemasse kätte nii, nagu on näidatud joonisel. Murdke tablett pöialde või nimetissõrmedega võrdseteks annusteks. Samamoodi võib need annused jagada uuesti võrdseteks osadeks.

Tabletid on müügil ka väiksema toimeaine sisaldusega.

Maksafunktsiooni kergekujuline halvenemine

Teie arst ravib teid ettevaatlikult, sest torasemiidi kontsentratsioon veres võib suurened.

Eakad patsiendid

Annust ei ole vaja kohandada.

Kasutamine lastel

Torasemiidi kasutamise kohta lastel ei ole piisavalt kogemusi ning sellepärast ei ole soovitat seda ravimit kasutada alla 12-aastastel lastel.

Manustamisviis

Võtke tablett igal hommikul koos toiduga või ilma. Ärge närige tabletti. Võtke tablett sisse koos 100 ml veega (vastab poolele klaasile veele).

Kasutamise kestus

Kasutamise kestuse üle otsustab arst. Torasemide HEXAL 200 mg võib pidevalt kasutada mitu aastat või kuni liigne vedelik kudedest on kadunud.

Kui te võtate Torasemide HEXAL 200 mg rohkem kui ette nähtud

Võtke kohe ühendust oma arsti või apteekriga.

Üleannustamine põhjustab tõenäoliselt ülemääraast kuseeritust, unisust, segasust, nõrkust, pearinglust, hüpotensiooni, vereringe kollapsit, maoärritust.

Võtke alati endaga kaasa ülejäänud tabletid ja tabletikarp, sest see aitab kergemini tuvastada, mis tablette te võtsite.

Kui te unustate Torasemide HEXAL 200 mg võtta

Võtke unustatud annus niipea, kui see meenub samal päeval või võtke järgmine annus tavalisel ajal. Ärge võtke kahekordset annust, kui tablett jäi eelmisel korral võtmata.

Kui te lõpetate Torasemide HEXAL 200 mg võtmise

Ärge lõpetage Torasemide HEXAL 200 mg võtmist arsti korralduseta, sest see võib teid tõsiselt kahjustada ja halvendada ravitulemust.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

4. Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Kõrvaltoimed võivad tekkida järgmise esinemissagedusega.

Sage: võivad tekkida kuni 1 inimesel 10-st

- kehavedelike ja mineraalide sisalduse häired, eriti kui esineb piiratud soolatarbimine;
- liigne aluselisis kehas;
- lihaskrambid, eriti ravi alguses;
- kusihappe-, suhkru- ja lipiidide (triglütseriidid, kolesterool) sisalduse suurenemine veres;
- vere kaaliumi- ja naatriumisisalduse vähenemine;
- veremahu vähenemine;
- mao ja/või soolestiku häired (nt söögiisu kadumine, kõhuvalu, iiveldus, oksendamine, kõhulahtisus, kõhukinnisus);
- teatud maksaensüümide sisalduse suurenemine (nt gamma-GT);
- peavalu;
- pearinglus;
- väsimus;
- nõrkus.

Aeg-ajalt: võivad tekkida kuni 1 inimesel 100-st

- vere urea- ja kreatiniinisalduse suurenemine;
- suukuivus;
- surin kätes ja jalgades;
- urineerimisraskus (nt eesnäärme suurenemisest).

Väga harv: võivad tekkida kuni 1 inimesel 10 000-st

- vere paksenemisest tingitud veresoonte ahenemine;
- madalam vererõhk kui tavaliselt;
- vereringeprobleemid, eriti püstitõusmisel;
- ebakorrapärane südamerütm;
- stenokardia (seisund, mida iseloomustab tugev valu rinnas);
- infarkt;
- minestamine;
- segasus;
- kõhunäärme põletik;
- allergilised reaktsioonid koos sügeluse ja lööbega;
- naha suurenenud valgustundlikkus;
- rasked nahareaktsioonid;
- vere punaliblede, valgeliblede ja vereliistakute arvu vähenemine;
- nägemisprobleemid;
- helin kõrvus;
- kuulmiskadu.

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

5. Kuidas Torasemide HEXAL 200 mg säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil pärast „EXP“.
Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Hoida temperatuuril kuni 25 °C.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

6. Pakendi sisu ja muu teave

Mida Torasemide HEXAL 200 mg sisaldab

- Toimeaine on torasemiid.

Üks tablett sisaldab 200 mg torasemiidi.

- Teised koostisosad on mikrokristalliline tselluloos, kopovidoon, krosповidoon, hüdrogeenitud riitsinusõli, magneesiumstearaat, mannitool (E 421), kolloidne veevaba ränidioksiid.

Kuidas Torasemide HEXAL 200 mg välja näeb ja pakendi sisu

Ümarad valged kuni kollakasvalged ristuvate poolitusjoontega tabletid.

Pakendi suurused: 10, 20, 30, 50, 100, 400 (20 × 20) tabletti.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja ja tootja

Müügiloa hoidja:

HEXAL AG

Industriestrasse 25

83607 Holzkirchen

Saksamaa

Tootjad:

Salutas Pharma GmbH,

Otto-von-Guericke-Allee 1,

39179 Barleben,

Saksamaa

LEK S.A.

16, Podlipie

95-010 Strykow

Poola

LEK S.A.

50C, Domaniewska

02-672 Varsavi

Poola

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.

Sandoz d.d. Eesti filiaal

Pärnu mnt. 105

11312 Tallinn

tel 6652 400

Infoleht on viimati uuendatud veebruaris 2016.