

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Antiflat 41,2 mg/ml suukaudne suspensioon Simetikoon

Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

Võtke seda ravimit alati täpselt nii, nagu on kirjeldatud selles infolehes või nagu arst või apteeker on teile selgitanud.

- Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
- Lisateabe saamiseks pidage nõu oma apteekriga.
- Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.
- Kui pärast mõne päeva möödumist te ei tunne end paremini või tunnete end halvemini, peate võtma ühendust arstiga.

Infolehe sisukord

1. Mis ravim on Antiflat ja milleks seda kasutatakse
2. Mida on vaja teada enne Antiflat'i võtmist
3. Kuidas Antiflat'i võtta
4. Võimalikud kõrvaltoimed
5. Kuidas Antiflat'i säilitada
6. Pakendi sisu ja muu teave

1. Mis ravim on Antiflat ja milleks seda kasutatakse

Seedehäired, vale toitumine, gaase tekitav toit ja õhu neelamine põhjustavad gaasi teket ja kogunemist. Ülemäärane gaas koguneb seedetrakti väikeste inaktiivsete gaasimullide kujul. Seetõttu on gaasi imendumine läbi soole limaskestast häiritud või isegi täielikult pärsitud.

Simetikoon on Antiflat suukaudse suspensioonis sisalduv toimeaine, mille toimel hakkavad gaasimullid lahustuma ning seejärel saab vabanenud gaas eralduda tavapärasel viisil.

Antiflat suukaudse suspensiooni manustamise tulemusena tavaliselt vähenevad kaebused kiiresti ja seedetraktis esinev pingeline alaneb.

Antiflat suukaudset suspensiooni kasutatakse:

- ülemäärase gaasi tekke ja kogunemise korral seedetraktis (meteorism), sh funktsionaalsete häirete nagu kõhupuhitus ja täiskõhutunde esinemisel;
- ettevalmistava vahendina seedetrakti diagnostilisel uuringul, nähtavuse parandamiseks ultraheli- ja röntgenuuringu puhul nägemisvälja piiravate gaasimullide eemaldamiseks.
- pesemisvahendite eksliku sissevõtmise järgselt abistava vahendina vahu vähendamiseks seedetraktis.

2. Mida on vaja teada enne Antiflat'i võtmist

Ärge võtke Antiflat'i

- Kui olete simetikooni või selle ravimi mistahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

- Kui Antiflat suukaudse suspensiooni võtmisel kaebused ei vähene või oodatud tulemusi ei saavuta; pöörduge palun täiendavate nõuannete saamiseks oma arsti poole.

Muud ravimid ja Antiflat

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te võtate või olete hiljuti võtnud või kavatsete võtta mistahes muid ravimeid

Kuigi simetikooni puhul ei ole ühtegi koostoimet täheldatud, ei saa simetikooni pindaktiivse toime tõttu välistada selle võimalikku mõju teiste toimeainete imendumisele.

Antiflat koos toidu ja joogiga

Antiflat suukaudset suspensiooni võib võtta söögi ajal või pärast sööki. Seda võib lisada soojale või külmale joogile (näit. tee, vesi, piim), ka joogipudelisse.

Rasedus ja imetamine

Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne ravimi kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Kuna simetikoon seedetraktis ei imendu, võib Antiflat suukaudset suspensiooni raseduse ja imetamise ajal manustada.

Manustamine ei tohi aga kesta üle kolme päeva, ja sellele peab järgnema 14-päevane annusevaba periood.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Mõju ei ole täheldatud.

3. Kuidas Antiflat'i võtta

Võtke seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst või apteeker on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Antiflat suukaudne suspensioon on sobiv imikutele, eakatele ja hambaproteesidega patsientidele.

Antiflat suukaudne suspensioon sobib diabeetikutele.

Soovitav annus ülemäärase gaasi tekke korral:

- imikud ja väikelapsed: 1 ml (2 vajutust või 16 tilka) lisatakse iga toidukord lutipudelisse/toidule;
- lapsed: 1 ml (2 vajutust või 16 tilka) koos lonksu veega söögi ajal või pärast sööki; vajadusel võib täiendada 1 ml (2 vajutust või 16 tilka) võtta magamaminekut;
- täiskasvanud: 1...2 ml (2...4 vajutust või 16...32 tilka) koos lonksu veega söögi ajal või pärast sööki; vajadusel võib täiendada 2 vajutust võtta enne magamaminekut.

Kasutades täiskasvanutel ettevalmistatava vahendina seedetrakti diagnostilisel uuringul, võetakse uuringule eelneval päeval ja uuringupäeva hommikul 2...3 ml (4...6 vajutust või 32...48 tilka) pärast iga söögikorda.

Kasutades pesemisvahenditest põhjustatud mürgistuse korral antidoodina, tuleb annust kohandada vastavalt mürgistuse raskusele. Minimaalne soovituslik annus on 5 ml (10 vajutust või 80 tilka)) Antiflat suukaudset suspensiooni.

Ravikuuri pikkus

Ravikuuri pikkus sõltub kaebuste kulust ja iseloomust. Antiflat suukaudset suspensiooni võib vajadusel manustada pidevalt.

Juhul kui Antiflat'i võtmisel kaebused ei leevendu või oodatud tulemust ei järgne, palun võtke ühendust oma arstiga edasiste juhtnõrde saamiseks.

Manustamisviis

Antiflat suukaudset suspensiooni võib võtta söögi ajal või peale sööki. Seda võib lisada soojale või külmale joogile (näit. tee, vesi, piim), ka joogi(luti)pudelisse.

Antiflat suukaudset suspensiooni tuleb enne manustamist loksutada.

Juhised mõõtepumba käsitsemiseks:

1. Eemaldage keeratav kork.
2. Keerake mõõtepump pudelikaelale.
3. Loksutage.
4. Asetage pump asendisse I (vt korki) ja vajutage kuni vedeliku väljumiseni. Ärge kasutage kahe esimese vajutusega väljunud vedelikku.
5. Pumpamise ajal hoidke pudelit püstises asendis.

Mõõtepumba aktiveerimisega kaasneva vedelikukao ja pudelisse jäävate jääkide kompenseerimiseks on pudelisse täiendavalt lisatud vastav kogus suspensiooni.

Mõõtepumba sulgemiseks tuleb seda keerata paremale, asendisse O (vt korki).

Juhised süstla käsitsemiseks:

1. Loksutage pudelit.
2. Eemaldage keermega kattedekork.
3. Suruge süstla kolb täielikult süstlasse ja sisestage süstla ülemine ots pudelikaela.
4. Hoidke pudel koos süstlaga vertikaalselt allapoole ja tõmmake kolbi kuni vajaliku koguse ml märgistuseni. Vajadusel korrake.
5. Eemaldage kolb täielikult pärast igat kasutuskorda ja puhastage hoolikalt kõik süstla osad jooksva vee all. Pärast kuivamist pange osad kokku tagasi.

Juhised tilguti käsitsemiseks:

1. Loksutage pudelit.
2. Eemaldage keeratav kork.
3. Hoidke pudel koos tilgutiga vertikaalselt allapoole suspensiooni tõmbamiseks.

Kui te võtate Antiflat'i rohkem kui ette nähtud

Kui teie olete või laps on võtnud Antiflat suukaudset suspensiooni rohkem kui ette nähtud, rääkige sellest oma arstile või apteekrile.

Kui te unustate Antiflat'i võtta

Ärge võtke kahekordset annust, kui annus jäi eelmisel korral võtmata.

Kui te lõpetate Antiflat'i võtmise

Rääkige sellest oma arstile või apteekrile kui soovite lõpetada Antiflat suukaudse suspensiooni võtmise.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

4. Võimalikud kõrvaltoimed

Kõrvaltoimeid ei ole täheldatud.

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

5. Kuidas Antiflat'i säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Hoida temperatuuril kuni 25°C.

Esmase avamise järgselt tohib Antiflat'i suukaudset suspensiooni kasutada kuni 6 kuu jooksul.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud pudelil ja karbil. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

6. Pakendi sisu ja muu teave

Mida Antiflat sisaldab

- Toimeaine on simetikoon. Üks ml (2 vajutust või 16 tilka) suspensiooni sisaldab 41,2 mg simetikooni.
- Teised abiained on sorbiinhape, kaaliumsorbaat, naatriumtsüklamaat, naatriumsahhariin, makrogool 6000, alumiiniummagneesiumsilikaat tüüp IIA, hüdroksüetüülselluloos, polüoksüetüleen-25-glütserüültriolaat, banaani maitseaine (maitseaine komponendid: maltodekstriin, kummiaraabik, propüleenglükool, maltool, etüülmaltool), veevaba sidrunhape (E330), puhastatud vesi.

Kuidas Antiflat välja näeb ja pakendi sisu

Antiflat suukaudne suspensioon on piimjas, läbipaistmatu 50 ml ja 100 ml pruunis klaaspudelis koos mõõtevahendiga, kas mõõtepumbaga või tilgutiga või mõõtelusikaga või süstla ja suukaudse manustamise adapteriga.

Mõõtelusikas 1...4 ml mõõtmiseks.

Süstal 0...3 ml mõõtmiseks.

Müügiloa hoidja ja tootja

G.L. Pharma GmbH
Schlossplatz 1
A-8502 Lannach
Austria

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.

Covalent OÜ
Pärnu mnt 102c,
Tallinn 11312,
Tel: +3726600945
Fax: +3726600946

Infoleht on viimati uuendatud juunis 2015