

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Trimetazidine Teva 35 mg, toimeainet prolongeeritult vabastavad tabletid Trimetasidiindivesinikkloriid

▼ Käesoleva ravimi suhtes kohaldatakse täiendavat järelevalvet, mis võimaldab kiiresti tuvastada uut ohutusteavet. Te saate sellele kaasa aidata, teavitades ravimi kõigist võimalikest kõrvaltoimetest. Kõrvaltoimetest teavitamise kohta vt lõik 4.

Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

- Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
- Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti või apteekriga.
- Ravim on välja kirjutatud üksnes teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik, isegi kui haigusnähud on sarnased.
- Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.

Infolehe sisukord

1. Mis ravim on Trimetazidine Teva ja milleks seda kasutatakse
2. Mida on vaja teada enne Trimetazidine Teva võtmist
3. Kuidas Trimetazidine Teva't võtta
4. Võimalikud kõrvaltoimed
5. Kuidas Trimetazidine Teva't säilitada
6. Pakendi sisu ja muu teave

1. Mis ravim on Trimetazidine Teva ja milleks seda kasutatakse

Ravimit kasutatakse täiskasvanutel stenokardia (koronaararteritõvest põhjustatud valu rinnus) raviks kombinatsioonis teiste ravimitega.

2. Mida on vaja teada enne Trimetazidine Teva võtmist

Ärge võtke Trimetazidine Teva't:

- kui olete trimetasidiini või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline.
- kui teil on Parkinsoni tõbi: ajuhaigus, mis mõjutab liikumist (värisemine, jäik kõnnak, aeglased liigutused ja tõmblused, ebakindel kõnnak).
- kui teil on tõsised neeruprobleemid.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Enne Trimetazidine Teva võtmist pidage nõu oma arsti või apteekriga.

- kui teil esineb neerufunktsiooni häireid. Sel juhul kohandab arst teile vastava annuse.
- kui teil on raskekujuline maksahaigus.

See ravim võib põhjustada või halvendada selliseid sümptomeid nagu värisemine, jäik kõnnak, aeglased liigutused ja tõmblused, ebakindel kõnnak, eriti eakatel patsientidel; neid sümptomeid tuleb jälgida ning teavitada nendest oma arsti, kes vajadusel hindab ravi ümber.

Trimetazidine Teva ei sobi ägedate stenokardiahoogude korral.

Lapsed ja noorukid

Trimetazidine Teva't ei soovitata kasutada alla 18-aastastel lastel.

Muud ravimid ja Trimetazidine Teva

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te võtate või olete hiljuti võtnud või kavatsete võtta mis tahes muid ravimeid.

Koostoimetest teiste ravimitega ei ole teatatud.

Trimetazidine Teva koos toidu ja joogiga

Trimetazidine Teva't võib võtta toidust ja joogist sõltumata.

Rasedus ja imetamine

Rasedus:

Hoiduge selle ravimi võtmisest raseduse ajal. Kui te selle ravimi võtmise ajal saate teada, et olete rase, küsige edasist nõu oma arstilt. Ainult teie arst võib otsustada, kas te peaksite jätkama Trimetazidine Teva võtmist.

Imetamine:

Ei ole teada, kas trimetasidiin eritub rinnapiima. Järelikult peaksite te selle võtmist imetamise ajal vältima.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

See ravim võib põhjustada peeringlust ja uimasust, mistõttu võib omada toimet teie autojuhtimise või masinate käsitlemise võimele.

3. Kuidas Trimetazidine Teva't võtta

Võtke seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Trimetazidine Teva soovitatav annus on 1 tablett kaks korda päevas hommiku- ja õhtusöögi ajal.

Kui teil on neeruprobleemid või kui te olete üle 75-aastane, võib arst teie annust kohandada.

Kasutamiskiis

Tabletid on suukaudseks kasutamiseks.

Palun võtke tablette koos piisava koguse vedelikuga, näiteks klaasi veega.

Kui te võtate Trimetazidine Teva't rohkem kui ette nähtud

Kui te olete võtnud liiga palju tablette, võtke otsekohe ühendust oma arstiga või pöörduge lähima haigla erakorralise meditsiini osakonda, et saada adekvaatset ravi.

Kui te unustate Trimetazidine Teva't võtta

Oluline on võtta oma ravimit iga päev. Kui te siiski unustate ühe või mitu annust võtmata, võtke järgmine annus niipea kui see teile meenub ja siis jätkake nagu määratud.

Ärge võtke kahekordset annust, kui annus jäi eelmisel korral võtmata.

Kui te lõpetate Trimetazidine Teva võtmise

Ärge lõpetage Trimetazidine Teva võtmist ilma arstiga konsulteerimata.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

4. Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Sageli esinevad kõrvaltoimed (mõjutavad 1...10 kasutajat 100-st):

pearinglus, peavalu, kõhuvalu, kõhulahtisus, seedehäired, iiveldus, oksendamine, nahalööve, sügelus, villid, nõrkusetunne.

Harva esinevad kõrvaltoimed (mõjutavad 1...10 kasutajat 10 000-st):

kiire või ebaregulaarne südamerütm (nimetatakse ka palpitatsioonideks), südame lisalöögid, kiire südamerütm, madal vererõhk püstitõusmisel, mis põhjustab pearinglust, pöörilustunnet või minestamist, üldine halb enesetunne, pearinglus, kukkumine, nahaõhetus.

Teadmata kõrvaltoimed (esinemissagedust ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel):

ekstrapüramidaalsümptomid (ebatavalised liigutused sealhulgas käte ning sõrmede värisemine ja vappumine, keha pöörlevad liigutused, jäik kõnnak ning käte ja jalgade jäikus), need sümptomid on tavaliselt pöörduvad ravi lõpetamisel.

Peapööritus (vertiigo).

Unehäired (uinumisraskused, uimasus), kõhukinnisus, raskekujuline generaliseerunud punetav villiline nahalööve, näo, huulte, suu-, keele- või kõriturse, mis võib põhjustada neelamis- või hingamisraskusi.

Valgete vererakkude hulga raskekujuline vähenemine, mis suurendab infektsioonide tekkeriski, trombotsüütide arvu langus, mis suurendab veritsuste või verevalumite tekkeriski.

Maksahaigus (iiveldus, oksendamine, söögiisu kaotus, üldine halb enesetunne, palavik, sügelus, naha ja silmade kollasus, hele väljaheide, tume uriin).

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

5. Kuidas Trimetazidine Teva´t säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil ja blistril. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Hoida temperatuuril kuni 30 °C.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

6. Pakendi sisu ja muu teave

Mida Trimetazidine Teva sisaldab

- Toimeaine on trimetasidiindivesinikkloriid.
Iga toimeainet prolongeeritult vabastav tablett sisaldab 35 mg trimetasidiindivesinikkloriidi.
- Teised koostisosad on hüpromelloos, kaltsiumvesinikfosfaatdihüdraat, magneesiumstearaat, kolloidne veevaba ränidioksiid, steariinhape, makrogool 6000, glütserool, titaandioksiid (E171), punane raudoksiid (E172).

Kuidas Trimetazidine Teva välja näeb ja pakendi sisu

Trimetazidine Teva on roosa, ümmargune, kaksikkumer õhukese polümeerikattega tablett. Blisterpakendis on 20, 60 või 120 toimeainet prolongeeritult vabastavat tabletti.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja ja tootja

Müügiloa hoidja:

Teva Pharma B.V.

Swensweg 5
2031 GA Haarlem
Holland

Tootja:
Merckle GmbH,
Ludwig-Merckle-Straße 3,
D-89143 Blaubeuren,
Saksamaa

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.

Teva Eesti esindus UAB Sicor Biotech Eesti filiaal
Hallivanamehe 4,
11317 Tallinn
Tel: +372 6610 801

Infoleht on viimati uuendatud juulis 2017.