

## **Pakendi infoleht: teave kasutajale**

### **Emox, 100mg/g, geel** Naprokseen

#### **Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.**

Kasutage seda ravimit alati täpselt nii, nagu on kirjeldatud selles infolehes või nagu arst on teile selgitanud.

- Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
- Lisateabe saamiseks pidage nõu oma apteekriga.
- Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arstiga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.
- Kui pärast 7 päeva möödumist te ei tunne end paremini või tunnete end halvemini, peate võtma ühendust arstiga.

#### **Infolehe sisukord**

1. Mis ravim on Emox ja milleks seda kasutatakse
2. Mida on vaja teada enne Emox'i kasutamist
3. Kuidas Emox'it kasutada
4. Võimalikud kõrvaltoimed
5. Kuidas Emox'it säilitada
6. Pakendi sisu ja muu teave

#### **1. Mis ravim on Emox ja milleks seda kasutatakse**

Emox sisaldab toimeainena naprokseeni, mis on mittesteroidne põletikuvastane aine.

Emox on paikseks kasutamiseks mõeldud valge mentoolilõhnaline ravimgeel, mille toimeaine naprokseen toimib nahale kandmisel valuvaigistina ja põletikuvastase ravimina. Emoxi kasutatakse valu paikseks leevendamiseks pehmete kudede valulike ja põletikuliste seisundite korral. Geel imendub hästi läbi naha ning vähendab valu ning paistetust.

#### **2. Mida on vaja teada enne Emox'i kasutamist**

##### **Ärge kasutage Emox'it**

- kui te olete naprokseeni või selle ravimi mistahes koostisosa(de) (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline;
- alates kuuendast raseduskuust ning imetamise ajal;
- nahapõletike ja -vigastuste ning lahtiste haavade korral.

##### **Hoiatused ja ettevaatusabinõud**

- kui teil esineb või on varem esinenud allergilisi reaktsioone (lööve, nahapunetus, sügelemine) ravi ajal teiste mittesteroidsete põletikuvastaste ravimite rühma kuuluvate ravimitega;
- ravimi pikaajalisel kasutamisel suurtel nahapindadel;
- Emox'it ei ole soovitatav kasutada alla 3-aastastel lastel

##### **Muud ravimid ja Emox**

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te kasutate, olete hiljuti kasutanud või kavatsete kasutada mistahes muid ravimeid.

Emox'it võib kasutada koos teiste naprokseeni sisaldavate ravimvormidega (tabletid, ravimküünlad jne).

Pidage nõu oma arstiga, kui te võtate mis tahes allpool loetletud ravimitest:

- Aspiriin/atsetüülsalitsüülhape trombide tekkimise ärahoidmiseks.

### **Rasedus ja imetamine**

Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arsti või apteekriga.

Kuna piisavad kliinilised andmed puuduvad, ei tohi Emox'it kasutada alates kuuendast raseduskuust ning imetamise ajal.

### **Autojuhtimine ja masinatega töötamine**

Andmed paiksest kasutatava naprokseeni negatiivse mõju kohta autojuhtimise ja masinate käsitlemise võimele puuduvad.

### **Emox sisaldab etüülparahüdroksübensoaati (E214).**

## **3. Kuidas Emox'it kasutada**

Kasutage seda ravimit alati täpselt nii nagu arst või apteeker on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Soovitatav annus on ligikaudu 4 cm pikkune riba geeli. Kandke ravim kuivale ja puhtale nahale, sõltuvalt kahjustatud ala suurusest, hõõrge valulikele alale laiali ning masseerige õrnalt kuni ravimi täieliku imendumiseni.

Emox'it võib kasutada 4 kuni 5 korda ööpäevas. Emox'it ei tohi kasutada kauem kui 4 nädalat. Pärast ravimi kasutamist peske käed, kui geeli kandmine kätele ei olnud ravieesmärk.

### **MÄRKUS**

Ärge kasutage Emox'it

- limaskestadel ja silmadel (kui geel satub silma või limaskestadele siis loputage neid rohke veega geeli eemaldamiseks),
- haavakatete (sidemete, plaastrite) all,
- suu kaudu.

Ravi ajal ja 2 nädalat pärast ravi vältige kokkupuudet otsese päikese kiirgusega (kaasa arvatud solaariumikiirgusega).

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Kui teil on tunne, et Emox'i toime on liiga tugev või liiga nõrk, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

## **4. Võimalikud kõrvaltoimed**

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Enamikul juhtudel on Emox hästi talutav.

Harva ( $\geq 1/10\ 000$  kuni  $< 1/1000$ ) võib täheldada paikset nahaärritust (punetust, nahalöövet, sügelemist), mis laheneb pärast ravi katkestamist.

Emox'i pikaajalisel kasutamisel suurteil nahapindadel ei saa välistada süsteemsete kõrvaltoimete nagu unisuse, kõhulahtisuse, iivelduse, peavalu, ülitundlikkusreaktsioonide teket. Nende nähtude ilmnemisel informeerige sellest oma arsti.

Hingamisprobleemide või nahamuutuste korral katkestage ravimi kasutamine koheselt ja pidage nõu oma arstiga või pöörduge lähimasse haiglasse.

Mõnel patsiendil võib Emox'i ravi ajal täheldada ka teisi kõrvaltoimeid.

## **Kõrvaltoimetest teavitamine**

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada [www.ravimiamet.ee](http://www.ravimiamet.ee) kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

## **5. Kuidas Emox'it säilitada**

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage Emox'it pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud pakendile. Kõlblikkusaeg viitab kuu viimasele päevale.

Ärge kasutage ravimit, kui selle välimus või lõhn on muutunud.

Hoida originaalpakendis ja tihedalt suletuna.

Mitte hoida külmkapis või sügavkülmas.

Pärast esmast avamist kõlblik 6 kuud.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

## **6. Pakendi sisu ja muu teave**

### **Mida Emox sisaldab**

Toimeaine on naprokseen.

Abiained on kloraalhüdraat, levomentool, etanool, etüülparahüdroksübensoaat (E214), naatriumhüdroksiid, karbomeer, puhastatud vesi.

### **Kuidas Emox välja näeb ja pakendi sisu**

Emox on ühtlane valge geel, ilma tahkete osakesteta ja iseloomuliku mentoolilõhnaga.

55 grammi geeli tuubis, mis on pakendatud pappkarpi.

### **Müügiloa hoidja**

PharmaSwiss Česká republika s.r.o

Jankovcova 1569/2c

170 00 Praha 7

Tšehhi vabariik

### **Tootja**

Emo-Farm Sp. z.o.o.

52 Lodzka St

95-054 Ksawerow

Poola

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole:

PharmaSwiss Eesti OÜ

Tammsaare tee 47

11316 Tallinn

Tel. +372 682 7400

**Infoleht on viimati uuendatud juunis 2018.**

