

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Octenisept 1 mg/ 20 mg/ml, nahalahus

Oktenidiindivesinikkloriid
Fenoksüetanool

Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

- Kasutage seda ravimit alati täpselt nii, nagu on kirjeldatud selles infolehes või nagu arst, apteeker või meditsiiniõde on teile selgitanud.
- Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
- Lisateabe saamiseks pidage nõu oma apteekriga.
- Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.
- Kui pärast 14 päeva möödumist te ei tunne end paremini või tunnete end halvemini, peate võtma ühendust arstiga.

Infolehe sisukord

1. Mis ravim on Octenisept ja milleks seda kasutatakse
2. Mida on vaja teada enne Octenisept'i kasutamist
3. Kuidas Octenisept'i kasutada
4. Võimalikud kõrvaltoimed
5. Kuidas Octenisept'i säilitada
6. Pakendi sisu ja muu teave

1. Mis ravim on Octenisept ja milleks seda kasutatakse

Octenisept on antiseptiline lahus, mille toimeainetel oktenidiindivesinikkloriidil (1 mg/ml) ja fenoksüetanoolil (20 mg/ml) on antiseptiline toime.

Octenisept'i kasutatakse

- lühiajaliseks ettevalmistavaks antiseptiliseks hoolduseks limaskestadel ja nendega piirneval nahal enne diagnostilisi ja kirurgilisi protseduure sugu- või erituselunditel või nende lähedal, sh uriinikateetri paigaldamisel, sobib ka korduvaks kasutamiseks.
- korduvaks lühiajaliseks väikeste pindmiste haavade antiseptiliseks raviks ning haava paranemise soodustamiseks.

Ravimit võib kasutada kõigil vanuserühmadel.

2. Mida on vaja teada enne Octenisept'i kasutamist

Ärge kasutage Octenisept'i

- kui olete oktenidiindivesinikkloriidi, fenoksüetanooli või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline.

- Octenisept'i ei tohi kasutada kõhuõõnes (nt operatsiooni ajal), kusepõies ega kanda trummikilele.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Enne Octenisept'i kasutamist pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega.

Kudede võimaliku kahjustamise vältimiseks ei tohi toote manustamisel (süstlaga või pealekandes) survet avaldada. Haavaõõne drenaaž peab olema tagatud (nt painduva drenaaživooliku kasutamiseks).

- Vältige Octenisept'i allaneelamist või selle sattumist vereringesse, nt tahtmatu süstimise tagajärjel.
- Kui Octenisept puutub kokku anioonsete pindaktiivsete ainetega (seep, pesuvahend), võib selle toimeaine oktenidiindivesinikkloriid ebaefektiivseks muutuda.
- Vastsündinutel, eriti enneaegselt sündinutel, tuleb ravimi kasutamisel olla ettevaatlik. Octenisept võib põhjustada tõsiseid nahakahjustusi. Eemaldage liigne ravim ja veenduge, et lahus ei jääks nahale kauemaks kui vajalik (sh materjalid, kuhu sattunud ravimitilgad on otseses kokkupuutes patsiendiga).
- Octenisept'i kasutamist silmas tuleb vältida. Silma sattumisel loputada kohe rohke veega.

Lapsed ja noorukid

Alla 6 aasta vanustel lastel ei tohi ilma arstiga konsulteerimata kasutada üle paari päeva.

Muud ravimid ja Octenisept

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te võtate või olete hiljuti võtnud mis tahes muid ravimeid, sealhulgas ilma retseptita ostetud ravimeid.

Ärge kasutage Octenisept'i nahapindade lähedal, mida on töödeldud povidoon-joodil põhinevate antiseptikumidega (desinfektandid), kuna ravimite kokkupuutekohal võib tekkida tugev pruun või lilla värvimuutus.

Ärge kasutage Octenisept'i koos anioonsete pindaktiivsete ainetega (seep, pesuaine jms), kuna need võivad vähendada või tühistada selle toime.

Rasedus, imetamine ja viljakus

Praegused kogemused ei näita Octenisept'i raseduse ajal kasutanud inimestel kahjulikku toimet.

Octenisept'i kasutamise kohta imetamise ajal andmed puuduvad. Ettevaatusabinõuna tuleb imetamise ajal vältida Octenisept'i pealekandmist rindade piirkonda.

Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arsti või apteekriga.

Octenisept'i toime kohta viljakusele andmed puuduvad.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Octenisept'il puudub toime autojuhtimise ja masinate käsitlemise võimele.

3. Kuidas Octenisept'i kasutada

Kasutage seda ravimit alati täpselt nii, nagu on kirjeldatud selles infolehes või nagu arst, apteeker või meditsiiniõde on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Manustamisviis

Octenisept'i kantakse kord päevas ravitavale alale, mis tuleb täielikult ravimiga niisutada.

Lahus on ette nähtud ainult paikseks kasutamiseks ning seda ei tohi kudedesse viia (nt süstlaga).

Hõõruge ravitavat piirkonda hoolikalt vähemalt 2 lahuses immutatud tampooniga, üksteise järel, ja veenduge, et pind on täielikult niisutatud. Raskesti ligipääsetavatele limaskestadele, nahale ja haavadele võib Octenisept kanda pihustades. Eelistatud on tampooniga pealekandmine.

Kasutamine lastel ja noorukitel

Soovitav annus on täiskasvanutel ja lastel ühesugune.

Efektiivsus

Palun pidage meeles, et lahuse täieliku toimimiseni tuleb pärast pealekandmist ja enne muude protseduuridega alustamist vähemalt 2 minutit oodata. Soovitavate tulemuste saavutamiseks tuleb neist juhistest rangelt kinni pidada.

Ravi kestus

Octenisept'i võib kasutada ainult **piiratud aja vältel**, kuna uuringu andmetel on siiani probleeme ainult pideva kasutamisega kauem kui **ligikaudu 14 päeva jooksul**.

Kui te kasutate Octenisept'i rohkem kui ette nähtud

Üleannustamise juhtudest ei ole teatatud. Ravimi juhiseid järgiva kasutamise korral on üledoos väga ebatõenäoline.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõdega.

4. Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Kõrvaltoimete esinemissagedused on määratud järgmiselt:

Väga sage	Enam kui ühel ravitud isikul 10-st
Sage	Ühel kuni 10-l ravitud isikul 100-st
Aeg-ajalt	Ühel kuni 10-l ravitud isikul 1000-st
Harv	Ühel kuni 10-l ravitud isikul 10 000-st
Väga harv	Vähem kui ühel ravitud isikul 10 000-st

Teadmata	Ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel
----------	---

Võimalikud kõrvaltoimed:

Harv: põletustunne, punetus, sügelus ja kuumatunne manustamiskohal

Väga harv: kontaktallergia tõttu tekkinud reaktsioon, nt ajutine punetus manustamiskohal.

Lapsed

Lastel esinevate kõrvaltoimete sagedus, tüüp ja raskusaste on sama mis täiskasvanutel.

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

5. Kuidas Octenisept'i säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud pudelile ja välispakendile. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Säilitusaeg pärast esmast avamist: kuni 1 aasta, kui seda on säilitatud kuni 25 °C juures.

See ravimpreparaat ei vaja säilitamisel eritingimusi.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

6. Pakendi sisu ja muu teave

Mida Octenisept sisaldab

Toimeained on oktenidiindivesinikkloriid (1 mg/ml) ja fenoksüetanool (20 mg/ml). Teised koostisosad on kokamidopropüülbetaiin, naatriumglükonaat, glütserool 85%, naatriumkloriid, naatriumhüdrosiid, puhastatud vesi.

Kuidas Octenisept välja näeb ja pakendi sisu

Octenisept on läbipaistev, värvitu, peaaegu lõhnatu, nahal kasutamiseks ettenähtud vedelik, mis on saadaval pakendites suurustega 50 ml, 250 ml, 500 ml või 1000 ml.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja:

Surgitech AS
Pärnu mnt 148

11317 Tallinn
Eesti
Tel. +372 646 0660
Email: surgitech@surgitech.ee

Tootja:

Schülke & Mayr GmbH
Robert-Koch-Str. 2
D-22851 Norderstedt
Saksamaa
Tel.: +49 (0) 40 52100-0
Faks: +49 (0) 40 52100-318
E-post: info@schuelke.com

Infoleht on viimati uuendatud novembris 2017.