

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA: INFORMĀCIJA ZĀĻU LIETOTĀJAM

GENTOS® pilieni iekšķīgai lietošanai, šķīdums

Aktīvās vielas:

Populus D1, Sabal D6, Conium D6, Kalium jodatum D12, Ferrum picrinicum D12

Uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju.

Šīs zāles ir pieejamas bez receptes. Tomēr jums jālieto GENTOS® rūpīgi, lai no zāļu lietošanas iegūtu vislabākos rezultātus.

- Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.
- Ja Jums nepieciešama papildus informācija vai padoms, vaicāiet farmaceitam.
- Ja Jūsu veselības stāvoklis pasliktinās vai neuzlabojas, Jums jāsazinās ar savu ārstu.
- Ja Jūs novērojat kādas blakusparādības, kas šajā instrukcijā nav minētas vai kāda no minētajām blakusparādībām Jums izpaužas smagi, lūdzu, izstāstiet to savam ārstam vai farmaceitam.

Šajā instrukcijā varat uzzināt

1. Kas ir GENTOS® un kādam nolūkam to lieto
2. Pirms GENTOS® lietošanas
3. Kā lietot GENTOS®
4. Iespējamās blakusparādības
5. Kā uzglabāt GENTOS®
6. Sīkāka informācija

1. KAS IR GENTOS® UN KĀDAM NOLŪKAM TO LIETO

GENTOS® pilieni ir prostatas un urīnpūšļa slimību ārstēšanai.

Indikācijas

Akūtu un hronisku priekšdziedzera slimību (labdabīga prostatas hiperplāzija, prostatīts), urīnpūšļa slimību (cistīts, urīnpūšļa vājums) un urinēšanas traucējumu (neatliekama vajadzība urinēt, nakts urinācija, nepilnīga urīnpūšļa iztukšošana) ārstēšanai.

Specifiskā GENTOS® sastāvdaļu kombinācija papildina tās iedarbības rezultātus, paplašinot indikāciju amplitūdu un paaugstina terapijas drošību un vienkāršību.

Atbilstoši mācībai par homeopātiskiem ārstniecības līdzekļiem GENTOS® sastāvdaļas palīdz atvieglot un izārstēt sekojošus traucējumus:

Populus (Papeles)	Priekšdziedzera labdabīga palielināšanās un urīnpūšļa katarāls iekaisums. Lēkmjveida sāpes urīnpūslī pēc urinēšanas. Palīg līdzeklis katarāla urīnpūšļa iekaisuma ārstēšanai.
Sabal (Sabalpalma)	Priekšdziedzera adenoma ar urinēšanu naktīs. Urīna pilēšana klepojot. Palīg līdzeklis prostatīta un epididimīta ārstēšanai.
Conium (Suņstobrs)	Priekšdziedzera hipertrofija. Bieža vajadzība urinēt (ar urīna pilēšanu). Palīg līdzeklis urīnpūšļa iekaisuma (ar gļotaini strutainu urīnu) ārstēšanai.
Kalium jodatum	Kairināts urīnpūslis. Sāpīga urinēšana, ko pavada niktūrija. Palīg līdzeklis

(Kālija jodāts)	prostatas un sēklinieku iekaisuma ārstēšanai pēc pārslimotas gonorejas vai sifilisa.
Ferrum picrinicum (Dzelzs pikrināts)	Vecuma priekšdziedzera hipertrofija ar spiediena vai pārpildītas taisnās zarnas sajūtu. Sāpes urīnizvadkanālā un dedzinošas sāpes urīnpūslī.

2. PIRMS GENTOS® LIETOŠANAS

Nelietojiet GENTOS® šādos gadījumos

- ja ir alerģija (paaugstināta jutība) pret aktīvajām vielām vai kādu citu sastāvdaļu.

Īpaša piesardzība lietojot GENTOS®, nepieciešama šādos gadījumos:

- jo GENTOS® pilieni satur 43 svara % etanola. Pieaugušo un pusaudžu reizes deva (10 pilieni) satur 0.16g etanola, kas nav ieteicams alkoholiķiem. Grūtniecēm un sievietēm zīdīšanas periodā, bērniem un pacientiem ar aknu saslimšanām, epilepsiju vai cukura diabētu ir jāņem vērā GENTOS® pilieni sastāvā esošais etanols.

Citu zāļu lietošana

Pastāstiet ārstam vai farmaceitam par visām zālēm, kuras lietojat vai pēdējā laikā esat lietojis, ieskaitot zāles, ko var iegādāties bez receptes.

Mijiedarbība ar citiem ārstniecības līdzekļiem līdz šim nav zināma.

GENTOS® lietošana kopā ar uzturu

GENTOS® vajadzētu lietot 30 minūtes pirms vai vismaz stundu pēc ēšanas, lai nodrošinātu maksimālu iedarbīgumu.

Grūtniecība un zīdīšanas periods

Pirms jebkuru zāļu lietošanas konsultējieties ar savu ārstu vai farmaceitu.

Pašreiz nav ziņu par iespējamiem riskiem lietojot, GENTOS® grūtniecības un zīdīšanas periodā.

Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana

Lietojot GENTOS ieteiktajās devās, tas neietekmē spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus.

Svarīga informācija par kādu no GENTOS® sastāvdaļām

Satur 43 svara % etanola. Etanola saturs 1ml = apmēram 0,40 g.

1ml = apmēram 25 pilieni.

3. KĀ LIETOT GENTOS®

Vienmēr lietojiet GENTOS® tieši tā, kā ārsts jums stāstījis. Neskaidrību gadījumā vaicājiēt ārstam vai farmaceitam. Ieteicamā deva ir:

	Devas	Lietošana
Pusaudži un pieaugušie	10 pilieni	Sākuma deva : 3 reizes dienā Ja nepieciešams, devu var samazināt līdz 2 reizēm dienā (uzturošā deva)

Ārstēšanās sākumā, kā arī lai paātrinātu slimības simptomu mazināšanos, pieaugušie un pusaudži

drīkst lietot 10 pilienus ik pēc 30-60 minūtēm (maksimums 8 reizes dienā). Kad sākas uzlabošanās, lietošanas biežumu vajadzētu samazināt līdz 3 reizēm dienā.

GENTOS® vajadzētu lietot 30 minūtes pirms vai vismaz stundu pēc ēšanas, lai nodrošinātu maksimālu iedarbīgumu.

GENTOS® ieteicams uzņemt neatšķaidītu vai atšķaidītu nelielā ūdens daudzumā.

Ja esat lietojis GENTOS® vairāk nekā noteikts

Sastāvdaļas ir lielā mērā atšķaidītas, tāpēc pārdozēšanas gadījumā nevajadzētu sagaidīt toksisku iedarbību vai kādus traucējumus.

Ja esat aizmirsis lietot GENTOS®

Nelietojiet dubultu devu, lai aizvietotu aizmirsto devu. Lietojiet nākamo devu pēc iespējas ātrāk.

Ja jūs pārtraucat lietot GENTOS®

Ja jums ir kādi jautājumi par šī produkta lietošanu, jautājiet savam ārstam vai farmaceitam.

4. IESPĒJAMĀS BLAKUSPARĀDĪBAS

Tāpat kā citas zāles, GENTOS® var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas. Ja novērojat jebkādas blakusparādības, lūdzam par to izstāstīt savam ārstam vai farmaceitam.

5. KĀ UZGLABĀT GENTOS®

Uzglabāt temperatūrā līdz 30°C

Uzglabāt cieši noslēgtā pudelē.

Uzglabāt oriģinālā iepakojumā. Sargāt no gaismas.

Uzglabāt bērniem nepieejamā un neredzamā vietā.

Nelietot GENTOS® pēc derīguma termiņa, kas norādīts uz etiķetes un kastītes.

Derīguma termiņš attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu.

6. SĪKĀKA INFORMĀCIJA

Ko GENTOS® satur

- Aktīvās vielas 100ml ir:

Populus D1 7ml

Sabal D6 10ml

Conium D6 10ml

Kalium jodatum D12 10ml

Ferrum picrinicum D12 10ml

- Citas sastāvdaļas ir 43 svara % etanola.

GENTOS® ārējais izskats un iepakojums

GENTOS® ir gatavots no augiem un citām dabiskām izejvielām, tam ir iespējamās garšas un smaržas svārstības, var būt arī viegls dulķojums, taču tas neietekmē ārstniecības līdzekļa iedarbību.

Stikla pudele ar plastmasas skrūvējamu korķīti un plastmasas pilienu sadalītāju.

Iepakojuma izmērs: 20ml, 50ml un 100ml. Visi iepakojuma lielumi tirgū var nebūt pieejami.

Reģistrācijas apliecības īpašnieks:

Ražotājs:

Richard Bittner AG,
Reisnerstraße 55-57
A-1030 Vīne, Austrija
tel.: +43 15030972
fakss: +43 1503097240
e-pasts: office.vienna@richard-bittner.com

Richard Bittner AG,
Ossiacherstrasse 7,
A-9560 Feldkirchen, Austrija
tel.: +43 0427644940
fakss: +43 04276449430
e-pasts: office@richard-bittner.com

Lai iegūtu papildus informāciju par šīm zālēm, lūdzam kontaktēt ar reģistrācijas apliecības īpašnieka pilnvaroto pārstāvi – SIA FITANIA, Bauskas iela 58-902, Rīga, LV-1004, tālr.: 67103144, fakss: 67103143, e-pasts: office@fitania.lv

Teksta pēdējās pārskatīšanas datums: 2008. gada 1. decembris
Šī lietošanas instrukcija akceptēta: