

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA: INFORMĀCIJA ZĀĻU LIETOTĀJAM

Oftagel 2,5 mg/g acu gels Karbomērs (*Carbomerum*) 974P

Uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju.

Šīs zāles ir pieejamas bez receptes. Tomēr Jums jālieto Oftagel rūpīgi, lai no zāļu lietošanas iegūtu vislabākos rezultātus.

- Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.
- Ja Jums nepieciešama papildus informācija vai padoms, vaicājiet farmaceitam.
- Ja Jūsu veselības stāvoklis pasliktinās vai neuzlabojas pēc dažām dienām, Jums jāsažinās ar savu ārstu.
- Ja Jūs novērojat kādas blakusparādības, kas šajā instrukcijā nav minētas, vai kāda no minētajām blakusparādībām Jums izpaužas smagi, lūdzu, izstāstiet to savam ārstam vai farmaceitam.

Šajā instrukcijā varat uzzināt:

1. Kas ir Oftagel un kādam nolūkam to lieto
2. Pirms Oftagel lietošanas
3. Kā lietot Oftagel
4. Iespējamās blakusparādības
5. Kā uzglabāt Oftagel
6. Sīkāka informācija

1. KAS IR OFTAGEL UN KĀDAM NOLŪKAM TO LIETO

Sausās acs sindroma ārstēšanai nepieciešami pilieni, kuri kā plēvīte aizsargā aci un kuriem ir labas mitrinošās īpašības. Lai sasniegtu šos mērķus Oftagel satur karbomēru, kas ir augstmolekulārs šķērseniskas struktūras polimērs. Karbomērs palielina acu pilienu viskozitāti un pagarina to saskarsmes laiku ar aci, kas samazina acs kairinājumu.

Oftagel acu gēlu lieto sausās acs sindroma simptomu ārstēšanai.

2. PIRMS OFTAGEL LIETOŠANAS

Nelietojiet Oftagel šādos gadījumos

- ja Jums ir alerģija (paaugstināta jutība) pret karbomēru 974P vai kādu citu Oftagel sastāvdaļu;
- Oftagel lietošanas laikā nedrīkst lietot mīkstās kontaktlēcas.

Īpaša piesardzība, lietojot Oftagel, nepieciešama šādos gadījumos

Lūdzu izņemiet cietās kontaktlēcas pirms Oftagel lietošanas. Tās var ievietot atpakaļ 15 minūtes pēc pilienu iepilināšanas.

Citu zāļu lietošana

Ja lokāli tiek lietoti vairāki medikamenti, tie jāiepilina ar vismaz 15 minūšu intervālu. Oftagel jālieto kā pēdējais.

Pastāstiet ārstam vai farmaceitam par visām zālēm, ko lietojat vai pēdējā laikā esat lietojis, ieskaitot zāles, ko var iegādāties bez receptes.

Grūtniecība un zīdīšanas periods

Līdz šim nav veikti pētījumi par šo zāļu ietekmi uz grūtniecību un zīdīšanu. Pirms jebkuru zāļu lietošanas konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu.

Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana

Oftagel var radīt īslaicīgi neskaidru redzi. Pacienti ar neskaidru redzi nedrīkst vadīt transportlīdzekļus vai apkalpot mehānismus pēc pilienu iepilināšanas tik ilgi, kamēr redzes asums atjaunojas.

Svarīga informācija par kādu no Oftagel sastāvdaļām

Benzalkonija hlorīds, kas ietilpst Oftagel sastāvā kā konservants, var mainīt kontaktlēcu krāsu un izraisīt acs kairinājumu.

3. KĀ LIETOT OFTAGEL

Vienmēr lietojiet Oftagel tieši tā, kā ārsts Jums stāstījis. Neskaidrību gadījumā vaicājiet ārstam vai farmaceitam. Ieteicamā deva ir 1 pilienis Oftagel 1 – 4 reizes dienā atkarībā no simptomu izteiktības.

Lietošana bērniem

Dati nav pieejami.

Pirms gēla lietošanas:

1. Nomazgājiet rokas.
2. Ieņemiet sev ērtu pozu (apsēdieties, apgulieties uz muguras, nostājieties pie spoguļa).

Gēla lietošana:


1. Atskrūvējiet pudelīti. Lai izvairītos no pudelītes satura inficēšanas, nepieskarieties ar pudelītes pilinātāju pie apkārtējiem priekšmetiem.
2. Atgāziet galvu atpakaļ un tuviniet pudelīti savai acij.



3. Pavelciet apakšējo plakstiņu uz leju un skatieties uz augšu. Viegli saspiediet pudelīti un iepiliniet gela pilienu acī.



4. Aizveriet aci un vairākas reizes pamirkšķiniet aci, lai ziede izplatās pa visu aci. Uzskrūvējiet vāciņu.



Ja esat lietojis Oftagel vairāk nekā noteikts

Ja esat iepilinājis vairāk Oftagel pilienu nekā noteikts, izskalojiet aci/-is ar ūdeni.

Ja esat aizmirsis lietot Oftagel

Nelietojiet dubultu devu, lai aizvietotu aizmirsto devu.

4. IESPĒJAMĀS BLAKUSPARĀDĪBAS

Tāpat kā citas zāles Oftagel var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas.

Oftagel acu gels īslaicīgi var izraisīt neskaidru redzi vai dedzinošu, kairinošu sajūtu.

Ja novērojat jebkādas blakusparādības, kas šajā instrukcijā nav minētas, vai kāda no minētajām blakusparādībām Jums izpaužas smagi, lūdzam par tām izstāstīt ārstam vai farmaceitam.

5. KĀ UZGLABĀT OFTAGEL

Uzglabāt bērniem nepieejamā un neredzamā vietā.

Uzglabāt temperatūrā no 15 līdz 25°C, sargājot no gaismas ietekmes.
Starp pilināšanas reizēm pudelīti glabāt apgrieztā veidā ar pilinātāju uz leju iepakojuma kārbīnā. Tas atvieglos gela iepilināšanu.

Nelietot Oftagel pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz iepakojuma. Derīguma termiņš attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu.
Pēc atvēršanas pudeli izmantot 28 dienu laikā.

Zāles nedrīkst izmest kopā ar sadzīves atkritumiem vai kanalizācijā. Vaicājiet farmaceitam par nevajadzīgo zāļu likvidēšanu. Šie pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi.

6. SĪKĀKA INFORMĀCIJA

Ko Oftagel satur

- Aktīvā viela ir karbomērs (*Carbomerum*) 974P 2,5 mg/g.
- Citas sastāvdaļas ir benzalkonija hlorīds, sorbīts, lizīna monohidrāts, nātrijs acetāta trihidrāts, polivinilspirts, ūdens injekcijām.

Oftagel ārējais izskats un iepakojums

Gels ir caurspīdīgs vai viegli opalescējošs, viskozs šķidrums.
Plastmasas pudelē ir 10 g gela.

Reģistrācijas apliecības īpašnieks un ražotājs

Santen Oy, P.O. Box 33, 33721 Tampere, Somija

Šī lietošanas instrukcija pēdējo reizi akceptēta

2012.gada janvārī