

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA: INFORMĀCIJA ZĀĻU LIETOTĀJAM

SANAGELS 30 mg/20 mg/g gels

Methyluracilum, Lidocaini hydrochloridum

Uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju.

Šīs zāles ir pieejamas bez receptes. Tomēr Jums jālieto **Sanagels** rūpīgi, lai no zāļu lietošanas iegūtu vislabākos rezultātus.

- Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.
- Ja Jums nepieciešama papildus informācija vai padoms, vaicājiet farmaceitam.
- Ja Jūsu veselības stāvoklis pasliktinās vai neuzlabojas, Jums jāsazinās ar savu ārstu.
- Ja Jūs novērojat kādas blakusparādības, kas šajā instrukcijā nav minētas vai kāda no minētajām blakusparādībām Jums izpaužas smagi, lūdzu, izstāstiet to savam ārstam vai farmaceitam.

Šajā instrukcijā varat uzzināt:

1. Kas ir **Sanagels** un kādam nolūkam to lieto
2. Pirms **Sanagela** lietošanas
3. Kā lietot **Sanagelu**
4. Iespējamās blakusparādības
5. Kā uzglabāt **Sanagelu**
6. Sīkāka informācija

1. KAS IR Sanagels UN KĀDAM NOLŪKAM TO LIETO

Sanagels ir līdzeklis gļotādas slimību lokālai ārstēšanai.

To lieto mutes gļotādas slimību (mutes dobuma iekaisums, apdegumi pēc staru terapijas, aftozais stomatīts, zobu ekstrakcija),

ginekoloģisku slimību (čūlu sanācija, gļotādas sausums un nieze, pēcoperāciju brūces),

uroloģisku un proktoloģisku slimību (pēcoperāciju brūces, anālās atveres un taisnās zarnas mikrotraumas, anālās atveres fisūras) ārstēšanai.

2. PIRMS Sanagela LIETOŠANAS

Nelietojiet Sanagelu šādos gadījumos

- leikozes akūtu un hronisku leukēmisko formu gadījumos, limfogranulomatozes, kaula smadzeņu ļaundabīgu slimību gadījumos;
- smagu aknu slimību gadījumos;
- pacientiem ar paaugstinātu jutību pret amīdu tipa lokālās anestēzijas līdzekļiem vai kādu citu gela sastāvdaļu;

- bērniem līdz 3 gadu vecumam.

Īpaši brīdinājumi un piesardzība lietošanā

- Nepieļaut gela iekļūšanu acīs, jo tam ir viegli kairinoša iedarbība uz acs gļotādu.
- Pacienti ar zināmu alerģiju pret citiem amīdu tipa vietējas anestēzijas līdzekļiem iespējama krustota alerģija pret lidokaīna hidrohlorīdu.
- Piesardzība lietošanā jāievēro pacientiem ar kardiovaskulāriem traucējumiem.

Svarīga informācija par kādu no *Sanagela* sastāvdaļām

Gela sastāvā iekļautās palīgvielas metilparahidroksibenzoāts un propilparahidroksibenzoāts var izraisīt alerģiskas reakcijas (iespējams, aizkavētas).

Citu zāļu lietošana

Pastāstiet ārstam vai farmaceitam par visām zālēm, kuras lietojat vai pēdējā laikā esat lietojis, ieskaitot zāles, ko var iegādāties bez receptes.

Gels potencē strofantīna iedarbību, pastiprina antibiotiku un sulfanilamīda preparātu darbību.

Grūtniecība un zīdīšanas periods

Pirms jebkuru zāļu lietošanas konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu.

Sanagelam nav lietošanas ierobežojumu grūtniecības un zīdīšanas perioda laikā.

Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana

Sanagels neietekmē spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus.

3. KĀ LIETOT *Sanagelu*

Vienmēr lietojiet **Sanagelu** tieši tā, kā ārsts Jums stāstījis. Neskaidrību gadījumā vaicājiet ārstam vai farmaceitam.

Pārklāt 3 – 4 reizes dienā ar plānu gela kārtu slimības skartās gļotādas vietas. Gela lietošanas ilgums līdz 10 dienām.

Ja Jums liekas, ka **Sanagela** iedarbība ir par stipru vai par vāju, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu.

Ja esat lietojis *Sanagelu* vairāk nekā noteikts

Liekais gela daudzums jānoņem ar vates tamponu.

Tikai ārīgai lietošanai!

4. IESPĒJAMĀS BLAKUSPARĀDĪBAS

Tāpat kā citas zāles, **Sanagels** var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas.

Ļoti retos gadījumos iespējamas vietējas alerģiskas reakcijas, vieglas galvassāpes un reibonis, garšas sajūtas pārmaiņas vai mēle nejutīgums.

Ja novērojat jebkādas blakusparādības, kas šajā instrukcijā nav minētas vai kāda no minētajām blakusparādībām Jums izpaužas smagi, lūdzam par tām izstāstīt ārstam vai farmaceitam.

5. KĀ UZGLABĀT Sanagelu

Uzglabāt bērniem nepieejamā un neredzamā vietā.

Nelietot **Sanagelu** pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz iepakojuma.

Sargāt no mitruma. Sargāt no gaismas.

Uzglabāt temperatūrā līdz 25 °C.

6. SĪKĀKA INFORMĀCIJA

Ko Sanagels satur

- Aktīvās vielas ir metiluracils (30 mg/g), lidokaīna hidrohlorīds (20 mg/g)
- Citas sastāvdaļas ir lecitīns, silbiols, α-tokoferols, metilparahidroksibenzoāts, propilparahidroksibenzoāts, trolamīns, karbomērs, etilspirts, attīrīts ūdens.

Sanagela ārējais izskats un iepakojums

Sanagels ir dzeltenīga viendabīga gelveida masa ar vieglu skuju smaržu. Pa 15 g alumīnija tūbās ar plastnāsas vāciņu, tūbas kopā ar lietošanas instrukciju ievietotas kartona kastītēs.

Reģistrācijas apliecības īpašnieks un ražotājs

SIA „LMP”,

Vietalvas 1, Rīga,

LV-1009, Latvija

info@lmp.lv

Šī lietošanas instrukcija akceptēta MM.GGGG

J. Doncu

SIA „LMP” atbildīgā amatpersona

M. Akermanis

SIA „LMP” farmaceits